Prof. G. N. Münch.

LEPRA und VITILIGO

IN SÜD-RUSSLAND UND TURKESTAN.

EX LIBRIS



WELLCOME BUREAU OF SCIENTIFIC RESEARCH

LONDON

22102307954

Med
K28430

THE PROPERTY OF
THE WELLCOME BUREAU
OF [illegible] RESEARCH.

THE PROPERTY OF
THE WELLCOME BUREAU
OF SCIENTIFIC RESEARCH.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29344219_0003

MATERIALIEN zur KENNTNISS

DER

LEPRA und VITILIGO

IN SÜD-RUSSLAND UND TURKESTAN.

Mit 149 Tafeln

(181 PHOTOGRAPHIEEN).

VON

Dr. G. N. Münch,

Ord. Prof. der Kaiserl. Wladimir-Universität zu Kiew, Ehrenmitglied der ärztlichen Vereine von Archangel, Jekaterinoslaw, Kiew, Odessa, Orel und der Kaiserl. Kaukasischen med. Gesellschaft.

Band. I. Lief. 3.

КІЕВЪ.

Типографія С. В. Кульженко, Ново-Елисаветинская. ул., соб. д.

ПРОКАЗА

НА ЮГѢ РОССІИ.

Г. Н. Минха.

ВЫПУСКЪ ТРЕТІЙ.

КІЕВЪ.
Въ университетской типографіи, Пироговская ул., д. № 4.
1886.

Оттискъ изъ Университетскихъ Извѣстій 1886 г.
Печатано по опредѣленію Совѣта Университета св. Владиміра.

WELLCOME INSTITUTE
LIBRARY
Coll.
Call
No. WC

241. Абдулимъ.

24) Абдулимъ, 26 лѣтъ. Сартъ Кураминскаго уѣзда. Служилъ у русскихъ въ Ташкентѣ въ качествѣ прислуги. Изъ разказовъ родныхъ узналъ, что братъ его матери былъ болѣнъ проказою; мать была здорова и умерла отъ родовъ.

Anamnesis. Болѣнъ 8 лѣтъ. Болѣзнь началась контрактурою лѣваго мизинца; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ показался пузырь подъ лѣвой лопаткой, а потомъ стало краснѣть лицо. Въ кишлакъ махау прибылъ только недѣлю тому назадъ, исходивъ предварительно огромное количество святыхъ мѣстъ.

St. praesens. Лицо чисто. Кожа надбробныхъ дугъ нависшая: въ кожѣ правой надбровной дуги ощущается твердый инфильтратъ; волосъ на бровяхъ нѣтъ, въ усахъ и бородѣ только слѣды. Правый глазъ не закрывается—нижнее вѣко отвисаетъ. Conjunctivae васкуляризованы. Носъ впалый. Уши не измѣнены. Въ полости рта измѣненій не замѣчается. Чувствительность лица сохранена.

Туловище. Подъ лѣвой лопаткой рубцовый слѣдъ pemphigus.

Верхнія конечности. На рукахъ кожа не измѣнена. Контрактура 4-хъ пальцевъ лѣвой руки. Чувствительность на лѣвой сторонѣ нѣсколько ослаблена.

Нижнія конечности. На колѣнахъ рубцы. Обѣ стопы припухшія, въ особенности лѣвая, на которой большой палецъ значительно утолщенъ; подъ ногтемъ его замѣчается скопленіе гноя. На мыщелкахъ обѣихъ стопъ рубцовые слѣды pemphigus Чувствительность въ нижнихъ конечностяхъ значительно ослаблена, въ особенности въ правой голени и стопѣ, гдѣ она почти отсутствуетъ.

Больной поступилъ въ кишлакъ махау вскорѣ послѣ моего отъѣзда изъ Туркестанской области и былъ осмотрѣнъ и записанъ Д-ромъ Паліенко. Черезъ 2 дня послѣ осмотра онъ внезапно умеръ.

(Д-ръ Паліенко).

242. Норъ-Гуль.

25) Норъ-Гуль, 26 лѣтъ. Киргизка Кураминскаго уѣзда. Замужъ вышла на 17-мъ году, но когда обнаружилась болѣзнь, то мужъ съ нею развелся и, поступивши въ махау-хану, около 2-хъ

лѣтъ тому назадъ, она вышла за Хази Баба (№ 3). Дѣтей не было. Больныхъ между родными и знакомыми не знаетъ.

Anamnesis. Больна около 6 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на лѣвомъ предплечіи. Регулы, появившіяся на 13 году, продолжаются и теперь, но очень скудны: скорѣе кровянистыя бѣли.

St. praesens. Лицо опухлое; на немъ обильныя, темно-синіе, поверхностные узлы (самый большой въ серебряный пятачокъ); на носу (уже 2-й годъ) язва, покрытая сухимъ темнымъ струпомъ. Въ кожѣ бровей, лишенныхъ волосъ,—бляшки. Анестезія лица. На мягкомъ нёбѣ рубцы и небольшія язвы.

Туловище. На поясницѣ узловатый инфильтратъ. Общая гиперестезія.

Верхнія конечности. На лѣвомъ предплечіи рубцовые слѣды пузырей и язвъ; подъ рубцами кожа склерозирована. Въ правомъ предплечіи равномѣрный, умѣренно плотный инфильтратъ тыла. Гиперестезія.

Нижнія конечности. Въ нижней части голеней не очень крупный, пятнисто-узловатый инфильтратъ. Гиперестезіи нѣтъ.

18 ^{24}/v 85.

243. Норъ-Биби.

26) Норъ-Биби, 27 лѣтъ; узбечка Кураминскаго уѣзда. Больныхъ между родными и знакомыми не было. Вышла замужъ 10 лѣтъ тому назадъ, но черезъ годъ, когда обнаружилась болѣзнь, бросила мужа и ушла въ махау-хану, гдѣ и вышла замужъ за Хази Баба (№ 3). Дѣтей не было.

Anamnesis. Больна 9-й годъ. Болѣзнь началась узлами на лицѣ.

St. praesens. Слѣды всосавшихся узловъ и инфильтраты, но уже мягкіе, на лицѣ, верхнихъ и нижнихъ конечностяхъ; кромѣ того, язвы (пузыри) на тѣхъ-же частяхъ. Анестезія.

18 ^{21}/v 85.

244 Анаръ.

27) Анаръ, 21 года, Кураминскаго уѣзда. Были ли больные между родными не знаетъ. На 19-мъ году вышла замужъ, но когда

заболѣла, то оставила мужа и ушла въ махау-хану, гдѣ и вышла замужъ за Хази Баба.

Anamnesis. Считаетъ себя больной 3-й годъ. Menstrua появились на 18-мъ году и были всего одинъ разъ, но часто являются бѣли.

St. praesens. Въ блѣдномъ лицѣ твердый узловатый инфильтратъ кожи, не исключая вѣкъ. Носъ приплюснутъ.

Туловище. На груди большія пигментныя пятна; на лѣвой mamma рубецъ. На животѣ разсѣяны рубцы. Такіе же рубцы и пигментныя пятна на животѣ. Гиперестезія на груди и спинѣ.

Верхнія конечности. Кожа конечностей не инфильтрована, блѣдна; въ отдѣльныхъ мѣстахъ прощупываются глубокіе узлы. Чувствительность не потеряна даже и на ульнарной сторонѣ.

Нижнія конечности. Кожа стопъ и голеней равномѣрно инфильтрована; инфильтратъ не особенно рѣзкій. Безпорядочная анестезія. $18^{24}/_{V}85$.

245. Жума-Куль.

28) Жума-Куль, Киргизка Кураминскаго уѣзда, 25 лѣтъ отъ роду. О болѣзни родныхъ ничего не знаетъ. 5 лѣтъ тому назадъ вышла замужъ и жила съ мужемъ 2 года, прижила ребенка, который умеръ на 1-мъ году; заболѣвши, оставила мужа и ушла въ махау-хану, гдѣ ее взялъ за себя Норъ Магометъ (№ 6).

Anamnesis. Считаетъ себя больной 2 года. Болѣзнь началась съ пузыря на правомъ колѣнѣ. Menstrua появились на 16-мъ году и уже годъ какъ совершенно отсутствуютъ: со времени заболѣванія они постепенно уменьшались въ количествѣ.

St. praesens. Лице гладкое. Ясный (при ощупываніи) узловатый инфильтратъ; узлы рѣзко дифференцированы и глубоки. Волосъ на бровяхъ нѣтъ. Носъ ввалился. На спинкѣ языка нѣсколько поверхностныхъ, выдающихся узловъ.

Туловище. Атрофія грудныхъ желѣзъ. Пигментныя пятна на спинѣ и груди. На мѣстѣ пояса инфильтратъ кожи.

Верхнія конечности. Сухія язвы на кистяхъ. Узловатый инфильтратъ тыла предплечій. Гиперестезія.

Нижнія конечности. Нерѣзко выраженный инфильтратъ голеней и стопъ Язва на концѣ праваго большаго пальца. Гиперестезія. 18 ^{24}/v 85.

246. Кати-Падша.

29) Кати-Падша, 26 лѣтъ. Изъ Ташкента. Родныхъ и знакомыхъ больныхъ не знаетъ. Вышла замужъ 16-ти лѣтъ и жила съ мужемъ 7 лѣтъ; имѣла на 1-мъ и 2-мъ году по ребенку, которые впрочемъ умерли на 5-мъ и 6-мъ мѣсяцѣ. Въ махау-ханѣ находится 3 года; замужъ вышла здѣсь за Кара-Бая (№ 2).

Anamnesis. Больна 8 лѣтъ. Menstrua появилась въ 14 лѣтъ; продолжаются и теперь, хотя и скудно.

St. praesens. На лбу, губахъ и подбородкѣ поверхностные, плоскіе, мягкіе, васкуляризованные узлы, розоваго цвѣта. Кожа на щекахъ мягкая и блѣдная. Волосъ на бровяхъ мало. Форма носа не измѣнена. На мягкомъ нёбѣ круглая язва, величиною въ 10 коп., съ твердымъ, возвышеннымъ валикомъ на рѣзко обрѣзанныхъ краяхъ.

Туловище. На кожѣ груди и около сосковъ пигментація, вокругъ сосковъ кожа инфильтрована. На спинѣ чувствительность слегка повышена. На поясницѣ узловатый инфильтратъ. На наружныхъ половыхъ частяхъ узловъ нѣтъ.

Верхнія конечности. На тылѣ лѣваго предплечія поверхностный, узловатый инфильтратъ; на локтѣ склерозированный рубецъ; мышцы кисти рѣзко атрофированы и въ пальцахъ замѣчается контрактура, особенно рѣзко выраженная въ мизинцѣ и 4-мъ пальцѣ, менѣе во 2-мъ и 3-мъ. На правой сторонѣ измѣненій не замѣчается. Анестезія безпорядочная на той и другой сторонѣ.

Нижнія конечности. Особенныхъ измѣненій нѣтъ. Концы пальцевъ утолщены. Чувствительность ослаблена и притомъ безпорядочно. 18 ^{24}/v 85.

247. Норъ-Ханы.

30) Норъ-Ханы, 40 лѣтъ. Узбечка Кураминскаго уѣзда. До болѣзни была замужемъ, съ которымъ жила 15 лѣтъ (вышла замужъ 25 лѣтъ); имѣла 4-хъ дѣтей, изъ которыхъ два и теперь живы и

TAFEL XV H.

Katti Padscha (№ 246). 26 a. n. Frau des Karabai (Taf. D).

Anamnese. Seit 8 Jahren krank. In der Ansiedelung seit 3 Jahren. Beginn?

Stat. praes. Recht weiche Knoten auf dem Gesicht und ebensolche Infiltrate in den oberen Extremitäten. Die Anaesthesieen ohne bestimmte Anordnung. Muskelatrophie der Hand und Contracturen der Finger. Hyperaesthesie der Haut des Rückens.

Taschkent. 1885.

Taf. XV, H.

TAFEL XV I.

Nor Chani (№ 247). 40 a. n. War verheirathet; ihre Kinder (19 und 16 Jahr alt) sind zu Hause und gesund. Jetzt ist sie mit dem Aksakal verheirathet (cf. Taf. C).

Anamnesis. Seit 10 Jahren krank. In der Ansiedelung 9 Jahre. Beginn: Blasen auf den Fingern.

Stat. praes. Primäre Nervenlepra. Kann ihre Augen nicht schliessen. Hyperästhesie der Brust und des Rückens. Anaesthesie der Vorderarme, Hände und Füsse. Muskelatrophie der Hände. Mutilationen.

Taschkent. 1885.

TAFEL XV K.

Chanitsch (№ 248). 23 a. n. Zweite Frau des Aksakal (cf. Taf. C).

Anamnesis. Seit 8 Jahren krank, seit 6 Jahren in der Ansiedelung. Beginn: 3 Jahre nach den Pocken begann das Gesicht zu schwellen.

Stat. praes. Das Gesicht geschwollen, gleichmässig infiltrirt. Augenbrauen dicht. Linksseitige Gesichtslähmung und Lagophthalmus paralyticus, welcher linkerseits schärfer ausgeprägt ist. Hyperästhesie der Brust und des Rückens. An den Extremitäten keinerlei Veränderungen. Keinerlei Atrophieen.

Taschkent. 1885.

здоровы: старшему изъ нихъ 19, младшему 16 лѣтъ. Бывшій мужъ, родные и знакомые всѣ здоровы. Въ махау-ханѣ 9 лѣтъ. Вышла замужъ за аксакала (№ 1).

Anamnesis. Больна 10-й годъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на пальцахъ рукъ. Menstrua появились на 16-мъ году, продолжаются и въ настоящее время ежемѣсячно. По временамъ появляются гноевидныя бѣли.

St. praesens. Лицо типическаго анестетика; брови цѣлы и густы; глаза не закрываются. Въ полости рта никакихъ измѣненій.

Туловище. На груди и спинѣ, кромѣ гиперестезіи, измѣненій нѣтъ.

Верхнія конечности. Обильные рубцы на правомъ предплечіи и кистяхъ обѣихъ рукъ. Рѣзкая мышечная атрофія кистей. Контрактуры и мутиляціи: на правой сторонѣ—контрактура большаго и 3-го пальцевъ, дефектъ двухъ послѣднихъ фалангъ 2-го, 4-го и 5-го пальцевъ; на лѣвой сторонѣ—дефектъ послѣдней фаланги 2-го пальца и контрактура остальныхъ. Анестезія предплечій и кистей.

Нижнія конечности. Анестезія стопъ. Полный дефектъ 2-го пальца правой ноги.

18 ^{24}/v 85.

248. Ханычь.

31) Ханычь, 23 лѣтъ, узбечка Кураминскаго уѣзда. Въ махау-ханѣ 6 лѣтъ, замужемъ за аксакаломъ (№ 1).

Anamnesis. Больна 8 лѣтъ. Болѣзнь началась, спустя 3 года послѣ перенесенной ею натуральной оспы, припухлостью лица. Регулы пришли въ 16 лѣтъ, продолжаются правильно и въ настоящее время.

St. praesens. Лице значительно опухшее, но безъ узловатостей; на немъ слѣды натуральной оспы. Цвѣтъ его блѣдный, брови густыя; глаза не закрываются, въ особенности лѣвый глазъ. Все лице значительно скошено на право. Въ полостяхъ рта и носа никакихъ измѣненій. Анестезіи нѣтъ.

Туловище. Гиперестезія кожи спины и груди.

Верхнія и нижнія конечности никакихъ измѣненій не представляютъ. Анестезій нѣтъ. 18 ^{24}/v 85.

249. Хурматъ-Биби.

32) Хурматъ-Биби, 27 лѣтъ. Сартянка Кураминскаго уѣзда, кишлака Хара-Мазаръ. Замужъ вышла на 13-мъ году и жила съ мужемъ 11 лѣтъ, приживъ съ нимъ на 2-мъ году замужества двойню, изъ которой одинъ ребенокъ живъ и здоровъ и теперь. Родныхъ и знакомыхъ больныхъ не знаетъ. Вышла замужъ за Хусанъ-Бая (№ 18) въ махау-ханѣ, гдѣ находится 4-й годъ.

Anamnesis. Больна 9 лѣтъ. Menstrua появились въ 11 лѣтъ и 9 лѣтъ уже отсутствуютъ совершенно. Бѣлей нѣтъ.

St. praesens. Узловатый инфильтратъ лица и язва, окруженная узлами, на мягкомъ нёбѣ; uvula инфильтрована узлами и укорочена.

Туловище. На груди и животѣ разсѣяны узловатые инфильтраты; таковые же на поясницѣ. Чувствительность не измѣнена.

Верхнія и нижнія конечности. Равномѣрный, плотный инфильтратъ тыла плечь, предплечій и кистей, а также передней поверхности бедеръ, голеней и стопъ. Чувствительность не измѣнена. 18 $^{24}/_{V}$ 85.

250. Нимъ-Биби.

33) Нимъ-Биби, 60 лѣтъ. Сартянка Кураминскаго уѣзда (кишлака Тилау). Въ махау-ханѣ находится 40 лѣтъ. 2 раза замужемъ: 2-ой мужъ живъ и теперь, а именно 28-ми лѣтній Норъ-Магометъ-Клычь-Бай. Дѣтей у Нимъ-Биби не было.

Anamnesis. Больна 41-й годъ. Болѣзнь обнаружилась пузырями на рукахъ и ногахъ. Регулы появились на 20-мъ году и продолжались правильно до 51-го года.

St. praesens. Чистый анестетикъ. Ectropion праваго нижняго вѣка. Лице скошено на лѣво. Брови густыя. Чувствительность сохранена. Въ полости рта никакихъ измѣненій.

Верхнія конечности. Рубцы и мутиляціи. На правой сторонѣ: отсутствіе всѣхъ пальцевъ и пястныхъ костей, за исключеніемъ os. metacarpi digiti primi, выдающейся на культѣ въ видѣ толстаго, закругленнаго придатка; у основанія этого придатка, съ локтевой стороны—язва въ формѣ трещины съ омозолѣлыми краями;

TAFEL XV L.

Nim Bibi (№ 250). 60 a. n. Befindet sich seit 40 Jahren in der Ansiedelung (Machau Chana) und ist hierselbst 2 mal verheirathet gewesen. Ihr zweiter Mann ist Klitsch-Bey, 28 a. n. (№ 231).

Anamnesis. 41 Jahre lang krank. Beginn: Blasen an Händen und Füssen. Menstruation begann im 20 Lebensjahre und dauerte regelmässig bis zum 51 Jahr.

Stat. praes. Rechtsseitige Gesichtslähmung und Lagophthalmus. Mutilationen an der rechten Hand und Contracturen der Finger der linken Hand. An den Füssen keinerlei Veränderungen abgesehen von einer oberflächlichen Pemphigusulceration auf einer Fusssohle. Sehr schwach ausgesprochene Anaesthesieen. Früher aber waren sie vorhanden. Zahlreiche Pemphigusnarben.

Taschkent. 1885.

кромѣ того, на локтевомъ углѣ культи свѣжій pemphigus въ формѣ плоскаго пузыря, величиною въ 20 коп., безъ малѣйшей реакціи въ окружности; на культѣ и около нея, а также на локтяхъ, бѣлые рубцы; чувствительность, ни тактильная, ни болевая, не нарушены (строго провѣрено); прежде она была потеряна. На лѣвой сторонѣ контрактура—и очень сильная—всѣхъ пальцевъ, причемъ 1-ая фаланга большаго пальца находится въ состояніи экстензіи, а 2-ая, также какъ и всѣ остальные пальцы,—флексіи; кромѣ того, сильная мышечная атрофія и кое-гдѣ рубцы. Чувствительность также не потеряна.

Нижнія конечности. Измѣненій нѣтъ, кромѣ язвы, довольно поверхностной, по краямъ шелушащейся, на правой подошвѣ, соотвѣтственно пяткѣ. Мутиляцій нѣтъ. Чувствительность сохранена.

18 $^{25}/_{V}$ 85.

251. Рисъ-Биби.

34) Рисъ-Биби, 25 лѣтъ. Сартянка Кураминскаго уѣзда. Замужъ вышла 14 лѣтъ, но жила съ мужемъ только 2 года, а потомъ мать и мужъ отправили ее въ махау-хану (на мой вопросъ: тяжело ли ей было уходить въ этотъ пріютъ? плакала ли она, разставаясь съ семьей? она отвѣчала отрицательно, пояснивши, что „такъ угодно Аллаху“. Въ махау-ханѣ вышла замужъ за Туръ-Магомета (№ 10). Родныхъ и знакомыхъ прокаженныхъ нѣтъ.

Anamnesis. Больна около 9 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась опухолью лица, которая позднѣе, благодаря насѣчкамъ, прошла. Менструировать начала 14-ти лѣтъ; регулы, однако, продолжались только 2 года.

St. praesens. Лице—чистое, бѣлое ,очень красивое, съ густыми черными бровями—замѣтно скошено на лѣво. Нижнія вѣки неподвижны и опущены; на нихъ постоянныя слезы. Uvula нѣсколько отклонена на право; на мягкомъ нёбѣ васкуляризація. На правой щекѣ слѣды скарификацій. Чувствительность совершенно потеряна.

Туловище. На поясницѣ пигментированные рубцы. Чувствительность сохранена.

Верхнія конечности. Никакихъ измѣненій, кромѣ рубца на ульнарной сторонѣ лѣваго предплечія. Чувствительность сохранена.

TAEEL XV N.

Rissalat (№ 253). 37 a. n. War bis zu ihrer Erkrankung verheirathet; besass 4 Kinder. In der Ansiedelung verheirathete sie sich abermals.

Anamnesis. 10 Jahre krank. Beginn: Schwellung des Gesichts, Blasen an den Fingern.

Stat. praes. Gesichtslähmung, auf der rechter Seite stärker ausgeprägt. Complete Anaesthesieen der Extremitäten. Muskelatrophie an den Vorderarmen und Händen. Mutilationen nur an den Händen. An den Fusssohlen perforirende Geschwüre.

Taschkent. 1885.

Taf. XV, N.

Anamnesis. Заболѣла 10 лѣтъ тому назадъ. Болѣзнь обнаружилась опухолью лица и пузырями на пальцахъ.

St. praesens. Лице худое, типическое для чистаго анестатика: ectropion обѣихъ нижнихъ вѣкъ, неподвижность чертъ, правосторонній параличъ, брови густыя. Во рту никакихъ измѣненій. Чувствительность сохранена.

Туловище. Блѣдныя пятна на животѣ. На поясницѣ мраморная окраска. Чувствительность сохранена.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцы. Мышцы предплечій и кистей атрофированы. Въ кистяхъ мутиляціи и контрактуры пальцевъ. На правой сторонѣ: контрактура большаго пальца; отсутствіе двухъ послѣднихъ фалангъ у всѣхъ пальцевъ; кромѣ того —обильные рубцы. На лѣвой сторонѣ: контрактура большаго пальца и каллёзная язва на тылѣ сочлененія 1-й фаланги съ пястью; на указательномъ пальцѣ цѣлы только 2 фаланги, ноготь помѣщается на 2-ой; въ 3-мъ и 4-мъ пальцахъ дефектъ двухъ послѣднихъ фалангъ, ноготь (уродливый) помѣщается на ладонной поверхности уцѣлѣвшей фаланги; въ мизинцѣ контрактура, а у основанія его язва съ твердыми омозолѣлыми краями. Чувствительность предплечій и кистей совершенно уничтожена.

Нижнія конечности. Большой правый палецъ утолщенъ, у основанія его на подошвенной сторонѣ прободающая язва, величиною въ 20 коп. Такая же язва на лѣвой подошвѣ у основанія 3-го пальца. На тылѣ стопъ слѣды скарификацій. Пателлярный рефлексъ на правой сторонѣ отсутствуетъ, на лѣвой—слабъ. Анестезія голеней и стопъ. $18\frac{25}{V}85$.

254. Рузланъ-Биби.

37) Рузланъ-Биби, 50 лѣтъ, сартянка Кураминскаго уѣзда. До болѣзни была замужемъ, съ которымъ жила 16 лѣтъ и прижила 4-хъ дѣтей (1-го до болѣзни, 3-хъ послѣ заболѣванія). Въ махау-ханѣ живетъ только одинъ годъ и здѣсь вышла за Турсуна (№ 22), которому только 21 годъ.

Anamnesis. Считаетъ себя больной 30 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на ногѣ. Менструировала съ 16 до 45 лѣтъ.

St. praesens. Лице нѣсколько припухшее, инфильтратъ мяг-

кій, равномѣрный. Волосъ на бровяхъ нѣтъ. Носъ слегка приплюснутъ. На мягкомъ нёбѣ плоская, нѣсколько возвышенная язва, величиною въ гривенникъ. Анестезія

Туловище. Рубцы около сосковъ и на кожѣ грудныхъ желѣзъ. Пигментированныя пятна на поясницѣ. Чувствительность не понижена.

Верхнія конечности. Рубцы на предплечіяхъ и кистяхъ, но ни узловъ, ни инфильтратовъ нѣтъ. У основанія праваго указательнаго пальца каллёзная язва. На 4-мъ пальцѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ свѣжій pemphigus. Чувствительность въ предплечіяхъ и кистяхъ потеряна.

Нижнія конечности. На голеняхъ и стопахъ обильные шелушащіеся рубцы. На пальцахъ язвы и мутиляціи. На правой сторонѣ: 4-го и 5-го пальца совершенно нѣтъ; 2-й и 3-й укорочены и утолщены, ногтей почти нѣтъ; у основанія большого пальца на подошвѣ прободающая язва. На лѣвой сторонѣ: язвы на концахъ послѣднихъ четырехъ пальцевъ, на 2—4-мъ поверхностныя, на 5-мъ, глубокая, проникающая до кости. Анестезія полная—бедеръ, голеней и стопъ. 18 ^{25}/v 85.

255. Ширимъ-Биби.

38) Ширимъ-Биби, 20 лѣтъ. Находится въ махау-ханѣ 5 лѣтъ; замужемъ за Баба-Муратомъ (№ 4), который заплатилъ ей калымъ въ 40 рублей.

Anamnesis. Болѣзнь началась 10 лѣтъ тому назадъ контрактурою пальцевъ, а потомъ показались пузыри на ногахъ. Менструировала только съ 15 до 19 лѣтъ.

St. praesens. Чистый анестетикъ: лице умѣренно полное; скошено слегка на лѣво; брови густыя; ectropion обѣихъ нижнихъ вѣкъ. Въ полости рта никакихъ измѣненій. На лбу анестезія.

Туловище. Пигментированныя и обезцвѣченныя пятна на груди и животѣ. На поясницѣ мелкія пигментированныя пятна. Чувствительность сохранена.

Верхнія конечности. Рубцы и атрофія мышцъ предплечій и кистей рукъ. Въ послѣднихъ мутиляціи. На правой сторонѣ: сильная контрактура большаго пальца (2-й фаланги) и указатель-

TAFEL XV O.

Schirim Bibi (№ 255). 20 a. n. Hat in der Ansiedelung geheirathet.

Anamnesis. Seit 10 Jahren krank. Beginn: Contracturen an den Fingern, darauf Blasen auf den Oberarmen. Menstruirte vom 15—19 Jahr.

Stat. praes. Rechtsseitige Lähmung; Lagophthalmus. Mutilationen und Contracturen der Finger. Muskelatrophie an den Händen. Mutilationen am linken Fuss und tiefe Narben am rechten. Complete universelle Anaesthesie.

Taschkent. 1885.

наго; дефектъ послѣднихъ фалангъ и контрактура первыхъ двухъ въ 3-мъ и 4-мъ пальцахъ; дефектъ 2-хъ послѣднихъ фалангъ мизинца. На лѣвой сторонѣ: контрактура большаго и указательнаго пальца и мизинца (кожа 5-й фаланги утолщена); дефекгъ 2-хъ послѣднихъ фалангъ 3-го и одной послѣдней 4-го пальцевъ. Полная анестезія, начиная съ половины плеча.

Нижнія конечности. Мутиляція лѣвой стопы: она значительно утолщена и укорочена, вслѣдствіе полнаго дефекта части предплюсневыхъ костей; пальцы цѣлы; на подошвѣ рубцы (слѣды выхожденія костей) и фистулёзное отверстіе, черезъ которое тоже выдѣлилась кость. На лѣвой стопѣ мутиляцій нѣтъ, хотя и есть рубцы, а именно два глубокихъ: одинъ у основанія 1-го пальца, другой на пяткѣ; 2-й палецъ не укороченъ, но искривленъ внутрь. Полная анестезія конечностей; отсутствіе пателлярнаго рефлекса.

$18\,^{25}/_{V}\,85$.

256. Роза-Кызи.

39) Роза-Кызи, 60 лѣтъ, сартянка изъ окрестностей Чемкента. Больныхъ между родными и знакомыми не знаетъ. До болѣзни была замужемъ, съ которымъ жила 7 лѣтъ и имѣла 4-хъ дѣтей, которыя всѣ умерли (замужъ вышла 18 лѣтъ). Въ махау-ханѣ находится уже 30 лѣтъ, и здѣсь на ней женился Абдурагимъ (№ 13).

Anamnesis. Больна болѣе 30 лѣтъ и вскорѣ послѣ заболѣванія поступила въ махау-хану. Болѣзнь обнаружилась опухолью лица. Менструировала съ 16 до 50 лѣтъ.

St. praesens. Чистый анестетикъ. Лице старческое, худое нѣсколько стянуто на право; ectropion лѣваго нижняго вѣка; брови густыя; измѣненій въ полости рта нѣтъ. Прикосновеніе локализируетъ плохо.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. На правомъ локтѣ рубцы. Умѣренная атрофія мышцъ предплечій и кистей. Чувствительность: на правой сторонѣ локализируетъ плохо, на лѣвой—довольно вѣрно.

Нижнія конечности. На правой сторонѣ мутиляцій и особенныхъ измѣненій нѣтъ; чувствительность сохранена. На лѣвой сторонѣ отъ стопы осталась только нѣсколько оттянутая назадъ и

видимо анкилозированная пяточная кость. Чувствительность ослаблена: локализація не вѣрна.

18 ^{25}/v 85.

257 Рюкъ-Сара.

40) Рюкъ-Сара, 13 лѣтъ. Ташкентская сартянка. Въ махауханѣ уже находится три года и здѣсь вышла за Абдурагима (№ 13).

Anamnesis. Болѣзнь началась незадолго до поступленія, въ махау-хану опухолью лица. Регулъ еще нѣтъ.

St. praesens. Лице темное, красноватое; въ нижней половинѣ лба и на бровяхъ, лишенныхъ волосъ, плоскіе поверхностные узлы, отдѣленные только другъ отъ друга глубокими бороздками. Такіе же поверхностные узлы находятся и на щекахъ и верхней губѣ. Форма носа не измѣнена, но онъ утолщенъ; инфильтратъ его равномѣрный. Въ кожѣ подбородка инфильтратъ узловатый; таковой же и въ нижней половинѣ щекъ. Въ верхнемъ вѣкѣ той и другой стороны глубокіе твердые узлы; на лѣвомъ—узелъ съ горошину, на правомъ меньше. На мягкомъ нёбѣ узлы довольно крупные, около конопляпаго зерна; uvula инфильтрована ими и имѣетъ видъ цвѣтной капусты.

Туловище. Сильная гиперестезія кожи, въ особенности поясницы у гребешка подвздошной кости; на лѣвой сторонѣ гиперестезія усилена до боли.

Верхнія конечности. На правомъ локтѣ нѣсколько склерозированныхъ небольшихъ рубцовъ; на лѣвомъ—язва, величиною въ пятакъ, круглая, сухая, красная съ рѣзкими краями. Кожа предплечій не измѣнена, мягка. Легкая гиперестезія.

Нижнія конечности. Измѣненій особенныхъ нѣтъ, кромѣ неяснаго, узловатаго инфильтрата въ сторонѣ ахиллесовыхъ сухожилій.

Рюкъ-Сара—intacta; по указанію мужа онъ ждетъ. согласно закону, появленія регулъ; но, по свидѣтельству старшей жены Абдурагима, надо думать, что Рюкъ останется навсегда дѣвственницей.

18 ^{25}/v 85.

TAFEL XV P.

Rjuk-Sara (№ 257). 13 a. n. Hat in der Ansiedelung geheirathet, in der sie seit 3 Jahren lebt.

Anamnesis. Seit 4 Jahren krank. Beginn: Schwellung des Gesichts.

Stat. praes. Infiltration des Gesichts, theils gleichmässig, theils knotig und oberflächliche Knoten, die durch Confluenz Papeln bilden. An den oberen und unteren Extremitäten, sind abgesehen von pemphiginösen Narben und einem Geschwür am Ellbogen, keine Veränderungen vorhanden. Keine Anaesthesieen, aber an einigen Stellen Hyperaesthesieen. Rjuk-Sara ist jungfräulich geblieben: nach Angabe des Mannes erwartet er, wie das Gesetz es vorschreibt, das Auftreten der Menses; dagegen behauptet die älteste seiner Frauen, der Mann sei impotent.

Taschkent. 1885.

ПЕСЕВЫЕ.

1. Муратъ-Бей-Мамараимъ.

Муратъ-Бей-Мамараимъ, 46 лѣтъ. Кураминскаго уѣзда, кишлака Хатчи-Сирта. Родители не болѣли; жилъ съ 6-ти лѣтняго возраста у дяди. На 16-мъ году у Мамараима замѣтили бѣлое пятно на спинѣ (хотя онъ былъ совершенно здоровъ) и его признали *песевымъ*. Дядя просилъ его уйти. Муратъ ушелъ, долго мыкался по свѣту, но его вездѣ прогоняли, какъ только замѣчали роковое бѣлое пятно. Въ виду этого, Мурату пришлось искать общества прокаженныхъ и своихъ собратій по болѣзни—песевыхъ, онъ помѣстился въ Ташкентской махау-ханѣ, гдѣ и служитъ сторожемъ и работникомъ 4 года.

St. praesens. Бѣлое рѣзко ограниченное пятно, величиною въ гривенникъ, на лѣвой брови; волоса въ сторонѣ пятна сѣдые. 5 небольшихъ кругловатыхъ пятенъ на лѣвой парастернальной линіи и десятка два пятенъ на спинѣ, большей частью маленькихъ и только 2, неправильной формы, величиной болѣе ладони: одно въ серединѣ, на уровнѣ первыхъ грудныхъ позвонковъ (въ центрѣ его нѣсколько темныхъ точекъ); другое—на лѣвой сторонѣ надъ поясничной областью; кругомъ нѣкоторыхъ пятенъ темная пигментація и безъ того довольно смуглой кожи. Симметріи въ расположеній пятенъ нѣтъ. Чувствительность вполнѣ сохранена. Общее здоровье какъ нельзя болѣе удовлетворительно.

2. Сара-Биби.

Сара-Биби, 50 лѣтъ. Ходжентская сартянка. Съ дѣтства считается *песевой* и съ 10 лѣтъ находится въ махау-ханѣ. На 25-мъ году она вышла замужъ, но мужъ ея, какъ указываютъ знавшіе его прокаженные и аксакалъ, хорошо знакомый съ проказою, былъ болѣнъ не ею, а болѣзнью называемою *гушъ*: язвы на рукахъ и ногахъ, но не такія, какія бываютъ при проказѣ; они утверждаютъ, что мужъ Сары попалъ въ махау-хану по недоразумѣнію. Отъ этого мужа она имѣла 6 дѣтей, изъ нихъ трое живы и здоровы. Послѣ смерти 1-го

мужа, Сара Биби вышла за Кара-Бая (№ 2). Менструировать начала съ 15 лѣтъ и регулы продолжаются и теперь. Бѣлыя пятна первоначально появились у нея на спинѣ.

St. praesens. Лице худое. Ectropion праваго вѣка, благодаря рубцу отъ пашахурды. На носу и около нижнихъ вѣкъ темныя пятна. Брови густыя, черныя; волоса на головѣ сѣдые. При осмотрѣ Сары женщинами-врачами тѣло ея найдено *совершенно бѣлымъ*.

Въ одно изъ посѣщеній махау-ханы мы встрѣтили сына Сары-Биби, *Холъ-Магомета-Ишь-Бая*, 25 лѣтъ отъ роду. Холъ-Магометъ родился и жилъ въ махау-ханѣ до 24 лѣтняго возраста, на 22-мъ году женился на совершенно здоровой сартянкѣ, которая пришла изъ Самарканда въ Ташкентскую махау-хану, провожая туда своего несеваго отца. Съ женою онъ прижилъ 3-хъ дѣтей и съ годъ оставилъ пріютъ прокаженныхъ и поселился въ Ташкентѣ. У Холъ-Магомета есть еще 2 здоровыхъ сестры, которыя, также какъ и онъ самъ, росли и воспитывались въ махау-ханѣ и совершенно здоровы; обѣ замужемъ и имѣютъ дѣтей.

МАРГЕЛАНЪ.

Маргеланская махау-хана, или—правильнѣй—кишлакъ, верстахъ въ 10, 15 отъ Стараго (Сартскаго) города, не великъ: не считая нѣкоторыхъ больныхъ, удалившихся съ цѣлью сбора милостыни, мною осмотрѣно въ немъ 6 прокаженныхъ (5 мужч. и 1 женщина) и 3 несевыхъ (2 мужч. и 1 женщ.); кромѣ того, одну больную дѣвочку привела ко мнѣ мать, съ просьбою вылѣчить. При осмотрѣ мнѣ содѣйствовали Д-ра Янушкевичъ и Волянскій (оба бывшіе кіевскіе студенты). Самый осмотръ производился на галереѣ дома помощника уѣзднаго начальника.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

---

258. Халь-Мурза.

1) Халь-Мурза, 38 лѣтъ, узбекъ Андижанскаго уѣзда. Изъ родныхъ никто не болѣлъ.

TAFEL XV R.

Sara-Bibi. (Vitiligo № 2). 50 a. n.

Anamnesis. Ist von Kindheit an krank und befindet sich von Kindheit an in der Machau-Chana.

Stat. praes. Am ganzen Körper ist sie weiss verfärbt, bis auf einige, zerstreute, kleine Fleckchen von normaler (brauner) Färbung auf dem Gesicht.

Ectropion des rechten Augenliedes in Folge einer Narbe nach einem Geschwür (Sartisches Geschwür-paschachurda).

Taschkent. 1885.

Anamnesis. Болѣнъ 6 лѣтъ. Указанія очень безтолковы.

St. praesens. Узловатый инфильтратъ кожи лица. Отсутствіе волосъ на бровяхъ и рѣсницъ, но усы и борода густые. Носъ ввалившійся. Uvula уничтожена; на мягкомъ нёбѣ рубецъ, окруженный узлами.

Туловище. На шеѣ большое количество фистулёзныхъ отверстій и увеличенныхъ лимфатическихъ желѣзъ.

Верхнія конечности. Въ кожѣ плечъ и предплечій—рѣдкіе, глубокіе узлы; на предплечіяхъ, кромѣ того, рубцовые слѣды пузырей. Кожа тыла кистей утолщена; инфильтратъ узловатый. Анестезія на плечахъ (безпорядочная), предплечіяхъ и тылѣ кистей; притомъ на лѣвой сторонѣ она гораздо слабѣе выражена.

Нижнія конечности. Въ кожѣ бедеръ рѣдкіе, глубокіе узлы. На правомъ колѣнѣ рубецъ. Кожа голеней утолщена, напряжена и въ отдѣльныхъ мѣстахъ лоснится; инфильтратъ довольно плотный, узловатый. Въ стопахъ такія же измѣненія. Анестезія, начиная съ нижней $^1/_2$ голени.

$18\,^5/_{VI}\,85$.

259. Буй-Магометъ.

2) Буй-Магометъ, 36 лѣтъ. Узбекъ, Курамипскаго уѣзда (Сыръ-Дарьинской Обл.). Болѣнъ ли кто либо изъ родныхъ и предковъ—не знаетъ. Прежде нежели попалъ ва махау-хану 3 года скрывался.

Anamnesis. Болѣнъ 13 лѣтъ. Разсказъ безтолковъ.

St. praesens. Субъектъ очень ослабленный: Лице блѣдное, кожа мягкая, вялая, мѣстами (нѣжнія вѣки) отвислая. Волосъ на бровяхъ, въ усахъ и бородѣ нѣтъ. Помутнѣніе обѣихъ роговицъ; на правой сторонѣ стафилома. На мягкомъ нёбѣ рубцовый слѣдъ язвы; на uvula узловатости.

Туловище. На груди и спинѣ пятенъ нѣтъ. Грудныя желѣзы сильно развиты.

Верхнія конечности. На локтяхъ и предплечіяхъ обильные рубцы, частью сѣтчатые, такой же окраски какъ кожа, частью —пигментированные или бѣлые; нѣкоторые изъ рубцовъ (на сочлененіи кисти, съ ладонной поверхности) склерозированы. Мышцы кистей

нѣсколько атрофичны и пальцы слегка контрактурированы. Общая анестезія.

Нижнія конечности. На колѣнахъ и голеняхъ рубцы. Пальцы ногъ утолщены, на нѣкоторыхъ изъ нихъ—на свободныхъ краяхъ—язвы; ногти изуродованы. Анестезія полная.

$18^{5}/_{VI}$ 85.

260. Гіазъ.

3) Гіазъ, 26 лѣтъ, сартъ Андижанскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣлъ проказою отецъ; страдалъ ею 14 лѣтъ и умеръ 10 лѣтъ тому назадъ, въ здѣшней махау-ханѣ.

Anamnesis. Заболѣлъ 10 лѣтъ тому назадъ; а именно—вскорѣ послѣ посѣщенія отца, у него обнаружился пузырь на тылѣ правой стопы, а черезъ 4 года начались измѣненія (опухоль) лица.

St. praesens. Узловатый, довольно плотный инфильтратъ кожи лица. Отсутствіе волосъ на бровяхъ и рѣсницъ, а также усовъ и бороды полное. Носъ сплюснутъ: конецъ его совершенно ввалился, а оба крыла выдаются по сторонамъ въ видѣ двухъ лопастей. Полость рта не осмотрѣна.

Туловище. На спинѣ пятенъ нѣтъ. На груди небольшія пятнышки темноватыя, не возвышенныя, при косомъ освѣщеніи отличающіяся блескомъ. Соски рѣзко выдаются, инфильтрованы, въ особенности правый. У отверстія urethrae прощупывается глубокій твердый узелъ; на кожѣ мошонки шагринированныя, возвышенныя, но довольно мягкія бляшки. Яички и epididimis утолщены, узловатостей нѣтъ. Анестезія кожи груди.

Верхнія конечности. Глубокіе узлы на тылѣ предплечій и кистей. Легкая контрактура 4-го и 5-го пальцевъ, въ особенности на лѣвой сторонѣ. Анестезія, начиная съ плечъ, полная.

Нижнія конечности. Рубцы и язвы на колѣнахъ и голеняхъ. Кожа послѣднихъ слегка утолщена (болѣе на лѣвой сторонѣ, гдѣ спереди находится довольно обширный бѣлый рубецъ, съ шелушащейся кругомъ его кожею). Утолщеніе кожи стопъ; инфильтратъ плотный; шелушеніе. Утолщеніе пальцевъ, какъ кожи такъ и костей (болѣе на правой сторонѣ), и язвы на пальцахъ и подошвѣ. Мутиляція—отсутствіе послѣдней фаланги—праваго большаго паль-

TAFEL XV S.

Buj-Mahomed (№ 259). 36 a. n. Befindet sich in der Machau-Chana seit 10 Jahren; vor dieser Zeit hielt er sich verborgen.

Anamnesis. Seit 13 Jahren krank. Seine Angaben über den Beginn der Erkrankung sind sehr verworren.

Stat. praes. Die Gesichtshaut ist weich, welk (regressive Periode). Zahlreiche Narben auf den Extremitäten. Muskelatrophie an den Händen. Contracturen der Finger. Verdickung und Sclerosirung der Haut der Zehen. Pemphigusgeschwüre auf dem Halse. Allgemeine Anaesthesie.

Stadt Margelan. Ferghana Gebiet. 1885.

TAFEL XV T.

Gias (№ 260). 26 a. n.

Anamnesis. Von den Verwandten war sein Vater krank und ist seit 10 Jahren todt. G. ist selbst etwa 10 Jahre krank. Beginn: Blasen auf dem rechten Fussrücken, 4 Jahre darauf Schwellung des Gesichts.

Stat. praes. Knotige Infiltration des Gesichts. Tiefliegende Knoten auf dem Dorsum der Vorderarme und der Hände, Contractur des 4-ten und 5-ten Fingers, linkerseits stärker ausgeprägt. Mutilationen der Finger und pemphiginöse Narben und Geschwüre an den unteren Extremitäten. Anaesthesieen an den oberen so wie unteren Extremitäten.

Margelan. 1885.

ца. Анестезія начиная съ бедеръ. Пателлярный рефлексъ отсутствуетъ. 18 5/VI 85.

261. Джау-Биръ.

4) Джау-Биръ, 22 лѣтъ, Каратегинецъ. Изъ родныхъ болѣлъ отецъ, умеръ 10 лѣтъ тому назадъ.

Anamnesis. Болѣнъ 12 лѣтъ и только годъ находится въ махау-ханѣ, до этого жилъ свободно въ Каратегинѣ. Болѣзнь началась съ пузыря на ногѣ.

St. praesens. Сплошной, мягкій, но слегка узловатый инфильтратъ въ кожѣ довольно блѣднаго лица. Сильная васкуляризація и бляшки на conjunctivae. Нижнія вѣки не поднимаются. Брови рѣдки; рѣсницы цѣлы; усовъ и бороды ни слѣда. Форма носа не измѣнена. Въ полости рта никакихъ измѣненій.

Туловище. Ни на груди, ни на спинѣ пятенъ нѣтъ. Членъ не измѣненъ. Яички атрофичны.

Верхнія конечности. Рубцы на тылѣ плечъ, локтяхъ и ulna'рной сторонѣ предплечій. Язва на ulna'рной сторонѣ мизинца, закрытыя струпомъ. Анестезія полная. Контрактуръ нѣтъ. Атрофія мышцъ не рѣзкая.

Нижнія конечности. Обильные рубцы на колѣнахъ, голеняхъ и стопахъ. Анестезія. Пателлярный рефлексъ на правой сторонѣ совершенно отсутствуетъ, на лѣвой—ослабленъ.

18 5/VI 85.

262. Иль-Мадрасуль.

5) Иль-Мадрасуль, 33 лѣтъ. Узбекъ Маргеланскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣли: дядя по отцѣ и сестра; помѣщались они въ махау-ханѣ и оба умерли, послѣдняя 3 года тому назадъ.

Anamnesis. Болѣнъ 13 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на ногѣ, потомъ стало пухнуть лице.

St. praesens. Больной ослабленъ. Лице довольно худое. Кожа вялая, съ слѣдами (мягкими) узловатаго инфильтрата. Бровей, усовъ и бороды нѣтъ. Носъ ввалился. На мягкомъ нёбѣ рубцы.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. Крайне худы. Обильные рубцы. Анестезія.

Нижнія конечности. Голени и стопы значительно утолщены, въ особенности послѣднія (elephantiasis). Кожа темнаго фіолетоваго цвѣта, покрыта обильной крупной шелухою. Пальцы сильно утолщены. 3-й, 4-й и 5-й пальцы лѣвой ноги мутилированы. На правой подошвѣ большая поверхностная язва (недавній pemphigus). Анестезія полная. 18 5/VI 85.

263. Ташъ-Биби.

6) Ташъ-Биби, 60 лѣтъ, узбечка Кокандскаго уѣзда. Была замужемъ и имѣла 5 человѣкъ дѣтей. Находится въ махау-ханѣ 20 лѣтъ. О томъ, какъ она туда попала, разсказываетъ слѣдующее: въ Маргеланъ пришла нищая прокаженная и замѣтивъ, что у Ташъ-Биби нѣтъ бровей, завлекла ее въ махау-хану, гдѣ ее удержали силою; два раза она убѣгала оттуда, но прокаженные ее отыскивали и снова водворяли въ махау-хану.

St. praesens. Никакихъ, сколько нибудь подозрительныхъ признаковъ болѣзни, ни даже анестезій (проконтролировано) нѣтъ, кромѣ полнаго отсутствія волосъ на бровяхъ.

18 5/VI 85.

ПЕСЕВЫЕ.

3. Хассанъ-Хаджа.

1) Хассанъ-Хаджа, 60 лѣтъ. Кашгарецъ. Болѣнъ 10 лѣтъ. Началась болѣзнь съ бѣлаго пятна въ сторонѣ правой ягодицы и затѣмъ пятна въ 3 года разошлись по всему тѣлу. Родители и родственники здоровы.

St. praesens. Видъ кахектическій, жалуется на общую слабость, но отправленія всѣ нормальны. Лице смуглое, пятенъ нѣтъ. Они начинаются съ шеи, и вся передняя часть груди, кромѣ маленькихъ темныхъ островковъ въ сторонѣ manubrii и темныхъ же полосокъ около сосковъ, бѣлаго цвѣта. Середина живота также окрашена нормальнымъ темнымъ (смуглая кожа) цвѣтомъ. Спина и поясница вся бѣлая, за исключеніемъ симметричныхъ темныхъ полосъ

TAFEL XV U.

Dschau-Bir (№ 261). Gebürtig aus Karategin, in der Nähe von Pamir.

Anamnesis. Sein Vater war krank, ist seit 10 Jahren todt. Er selbst ist seit 12 Jahren krank, befindet sich aber in der Ansiedelung nur ein Jahr; bis dahin lebte er zu Hause in Karategin. Beginn: Blasen an den Füssen.

Stat. praes. Weiche (regressive Periode), leicht knotige Infiltration der Gesichtshaut. Lagophthalmus. Zahlreiche Narben an den Extremitäten. Pemphigusgeschwür am kleinen Finger. Leichte Muskelatrophie an den Händen. Anaesthesieen.

Margelan. 1885.

TAFEL XV V.

Il-Madrasul (№ 262). 38 a. n.

Anamnesis. Ein Onkel väterlicherseits und die eine Schwester waren krank und sind beide todt, letztere seit 3 Jahren. Er selbst ist 13 Jahre krank. Beginn: Blasen an den Füssen.

Stat. praes. Fast vollständig resorbirte Infiltrate. Zahlreiche Narben an den Extremitäten. Verdickung und Sclerose der Haut der Unterschenkel und Füsse, reichliche Desquamation. Mutilationen an den Fingern des linken Fusses. Anaesthesieen.

Margelan. 1885.

около внутренняго края лопатокъ и участка кожи въ сторонѣ правой cristae scapulae.

Конечности. Наружная поверхность плечъ и предплечій почти сплошнаго бѣлаго цвѣта; внутренняя—темнаго. На тыльной поверхности кистей рукъ небольшое количество бѣлыхъ пятенъ. Верхняя половина бедеръ бѣлая; съ нижней половины бедеръ спереди и сзади начинается, темный узоръ, который переходитъ въ сплошную темную окраску колѣнъ; на голеняхъ и тылѣ стопъ бѣлыя пятна, за исключеніемъ нижней $^1/_3$ голеней, гдѣ окраска темная.

4. Ташъ-Магометъ.

2) Ташъ-Магометъ, 27 лѣтъ, Таджикъ, Маргеланскаго уѣзда. Родители и родственники здоровы. Болѣнъ 10 лѣтъ. Первое пятно показалось на лбу; потомъ, спустя 2 года, явилось новое—на поясницѣ и затѣмъ пятна разошлись по всему тѣлу. Женатъ въ махау-ханѣ уже 3 года на Аимъ-Биби (№ 5).

St. praesens. На смугломъ лицѣ бѣлая полоса, занимающая всю верхнюю половину лба. Волоса на головѣ черные. Шея темнаго цвѣта. Грудь почти вся бѣлая, за исключеніемъ manubrii, куда спускается темная окраска кожи шеи, и темныхъ пятенъ или—правильнѣй—узоровъ, такъ какъ въ темныхъ пятнахъ помѣщаются болѣе или менѣе крупные бѣлые; пятна эти находятся: подъ мышками—большое пятно въ области праваго соска и, соотвѣтственно ему, полоска, шириною въ палецъ, кнаружи отъ лѣваго соска; большое неправильное пятно въ области epigastrii. Спина вся бѣлая, за исключеніемъ небольшихъ темноватыхъ пятенъ на ягодицахъ.

Конечности. Верхнія конечности бѣлаго цвѣта, за исключеніемъ симметрическихъ темныхъ полосъ въ локтевомъ сгибѣ и пятенъ на тылѣ плечеваго сочлененія, а также темноватыхъ пятнышекъ на тылѣ сочлененія обѣихъ кистей. Нижнія конечности: темныя пятна въ области колѣнъ спереди и таковыя же узоры сзади; на голеняхъ рѣдкія пятна.

5. Аимъ-Биби

3) Аимъ-Биби, 30 лѣтъ. Таджичка, изъ того же кишлака, откуда и мужъ—Ташъ-Магометъ. Родители здоровы. Болѣзнь нача-

лась, когда ей было 12 лѣтъ, съ пятна на спинѣ. 14-ти лѣтъ она вышла замужъ за песеваго, а когда онъ умеръ, ушла сама въ махаухану, такъ какъ ей было стыдно оставаться въ кишлакѣ: ею всѣ брезгали и никто не бралъ замужъ. Отъ перваго мужа имѣла ребенка, которому теперь 16 лѣтъ—онъ совершенно здоровъ; отъ Ташъ-Магомета имѣетъ 2 дѣтей: $1^1/_2$ года и 4 мѣсяцевъ, оба здоровы (осмотрѣны).

Sr. praesens. Совершенно здорова, кромѣ пятенъ довольно обильныхъ (по ея словамъ) на туловищѣ и конечностяхъ (осмотръ женщины не допускается по закону). Лице темное.

6. Дѣвочка Сартянка.

4) Дѣвочка Сартянка (фамилія не записана), 8 лѣтъ. Ее привела ко мнѣ мать, съ просьбою—не могу ли я помочь ей. Дѣвочка больна года 2. Первое пятно показалось на нижней губѣ и затѣмъ, въ теченіи 2 лѣтъ, пятна показались и на другихъ частяхъ тѣла. Ребенокъ былъ все время здоровъ. Отецъ и мать здоровы, также не было больныхъ и среди родственниковъ.

St. praesens. Блѣдное пятно или—правильнѣй—рубецъ на нижней губѣ, величиною въ пятакъ. Рубецъ, со словъ матери, произошелъ отъ прижиганія „алмазомъ“ (вѣроятно—крѣпкой водкой!), средство ходячее для уничтоженія (?) бѣлыхъ пятенъ; другое пятно тоже на лицѣ, а именно—на лбу, нѣсколько правѣе пробора; пятно величиною въ 20 коп. Далѣе, пятна на шеѣ и туловищѣ: на шеѣ сзади, тотчасъ подъ волосами пятно въ пятакъ, съ рубцомъ (алмазъ), окруженное довольно широкой темной каймой; на груди и животѣ 16 пятенъ—самое большое въ 3 коп., меньшее въ гривенникъ; пятна разсѣяны безпорядочно и окружены темнымъ болѣе или менѣе широкимъ кольцомъ, опоясывающимъ или отдѣльное пятно или нѣсколько пятенъ вмѣстѣ: послѣднее имѣетъ мѣсто въ нижней лѣвой половинѣ груди, гдѣ темная, начинающаяся около середины грудины полоса, расширяясь, захватываетъ всю нижнюю половину груди и верхнюю часть живота и огибается затѣмъ на спину; въ этой полосѣ помѣщается 10 бѣлыхъ пятенъ. На спинѣ, на уровнѣ нижнихъ лѣвыхъ реберъ, большое—величиною въ ладонь—бѣлое пятно (не первое ли?), овальной формы, окруженное довольно широкимъ, тем-

TAFEL XV W. Figur 1 und 2.

Hassan-Chadra (Vitiligo. № 3). 60 a. n. Gebürtig aus Kaschgar.

Anamnesis. Seit 10 Jahren krank. Beginn: der erste Fleck trat auf dem rechten Gesäss auf; nach 3 Jahren verbreiteten sich die Flecke über den ganzen Körper.

Stat. praes. Cf. Abbildung. Nirgends Anaesthesieen vorhanden.

Margelan. 1885.

Taf. XV, W. 1, 2.

TAFEL XV X. Fig 1 und 2.

Tasch-Mahomet (Vit. № 4).

Anamnesis. Eltern und Geschwister gesund. T. ist seit 10 Jahren krank. Beginn: der erste Fleck auf der Stirn, 2 Jahre später auf dem Kreuz.

Stat. praes. Vitiligo (cf. Abbildg).

Margelan. 1885.

Taf. XV, X. 1, 2.

TAFEL XV Y Fig. 1 und 2.

Sartisches Mädchen (Vit. № 6). 8 a. n.

Anamnesis. Eltern und Verwandte gesund. Pat. ist seit 2 Jahren krank. Biginn: erster Fleck auf der Unterlippe.

Stat. praes. Vitiligo.

Margelan. 1885.

TAFEL XV Z.

Kischlak-Machau in der Stadt Andidzan, im Ferghana—Gebiet. Hier findet man nur Vitiligo—Kranke.

нымъ неправильнымъ поясомъ. Въ лѣвой лопаточной области 3 небольшихъ пятна, изъ которыхъ 2 нижнихъ помѣщаются въ продолженіи темной полосы, описанной на груди. Въ остальномъ дѣвочка совершенно здорова, хотя питаніе ея невполнѣ удовлетворительно и она анемична.

АНДИЖАНЪ.

Андижанскій кишлакъ махау находится въ 8—10 верстахъ отъ стараго (сартскаго) города, версты 2 въ сторону отъ большой дороги. Въ кишлакѣ этомъ, кромѣ одного прокаженнаго (?), а именно аксакала, остальные больные—песевые. Этихъ послѣднихъ, какъ мнѣ сообщили, 37 человѣкъ; изъ нихъ осмотрѣно мною 34 человѣка (22 мужчины—всѣ они фотографированы—и 12 женщинъ); 3 больныхъ ушли просить милостыню. Песевые живутъ со своими семьями—здоровыми чадами и домочадцами—такъ что цифра населенія кишлака, считая больныхъ и здоровыхъ, превышаетъ 70 человѣкъ.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

---

263. Махметъ-Насыръ. (Табл. XV) [1].

1) Махметъ-Насыръ, 54 лѣтъ. Родина Ура-Тюбе. Состоитъ аксакаломъ Андижанскаго кишлака махау. Родители здоровы, также не было больныхъ и между родными. Считаетъ себя больнымъ и находится въ махау-кишлакѣ 30 лѣтъ. Женатъ на песевой (№ 35), имѣетъ отъ нея ребенка.

St. praesens. Никакихъ признаковъ проказы, кромѣ отсутствія волосъ на бровяхъ, а также и рѣсницъ; волосъ въ усахъ и бородѣ почти нѣтъ—отдѣльные сѣдые волоски; кожа лица мягкая, отвислая, напоминающая кожу атрофическаго періода проказы. На тѣлѣ ни рубцовъ, ни анестезій (строго проконтролировано).

18 9/VI 85.

---

[1]) Негативы для табл. XV (стр. 228 № 175 и стр. 258 № 198), къ сожалѣнію, не дошли до Лейпцига; если удастся воспроизвести ихъ съ имѣющихся у меня позитивовъ, то они будутъ напечатаны въ отдѣлѣ Патологіи.

ПЕСЕВЫЕ.

7. Норъ-Магометъ. (Табл. XV).

1) Норъ-Магометъ, 65 лѣтъ отъ роду. Передъ заболѣваніемъ былъ совершенно здоровъ и считался хорошимъ работникомъ. Первое пятно показалось на серединѣ спины и затѣмъ, въ теченіи 10 лѣтъ, онъ дошелъ до того состоянія, въ которомъ находится и теперь. Женатъ. Жена совершенно здоровая, когда онъ заболѣлъ, ушла съ нимъ въ махау-кишлакъ. Имѣлъ 15 человѣкъ дѣтей; старшему 31 годъ; осталось всѣхъ дѣтей 8, всѣ они совершенно здоровы.

St. praesens. Надпереносье, область бровей, вѣки, щеки и носъ равномѣрно окрашены буроватымъ (нормальнымъ) цвѣтомъ. Остальныя части тѣла, также какъ и туловище и конечности, совершенно бѣлаго цвѣта. Волоса на головѣ сѣдые; на туловищѣ и конечностяхъ мѣстами—бѣлые, мѣстами—нѣтъ.

8. Мадьяръ-Мамадрамъ-Бай. (Табл. XV).

2) Мадьяръ-Мамадрамъ-Бай, 58 лѣтъ. Въ роду больныхъ не было. Женатъ вторично въ кишлакѣ махау. Имѣлъ 8 человѣкъ дѣтей, въ живыхъ осталось одно. Болѣнъ 30 лѣтъ, въ махау-кишлакѣ 25 лѣтъ. Первое пятно показалось на поясницѣ; а затѣмъ пятна пошли по всему тѣлу, сливаясь другъ съ другомъ. Въ теченіи 10 лѣтъ дошелъ до того состоянія, въ которомъ находится теперь. Передъ заболѣваніемъ песью былъ совершенно здоровъ.

St. praesens. Совершенно здоровъ. Весь бѣлый, исключая лица, а именно тѣхъ же областей, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, но окраска имѣетъ характеръ не сплошной, а мелкихъ, темныхъ точекъ.

9. Азисъ-Бей. (Табл. XVII).

3) Азисъ-Бей, 44 лѣтъ. Узбекъ Маргеланскаго уѣзда. Болѣнъ 30 лѣтъ. Женился здѣсь и имѣетъ 6 человѣкъ дѣтей, жена (родившаяся отъ песевыхъ родителей) и дѣти здоровы. Болѣзнь началась пятномъ на правой ягодицѣ и шла очень медленно.

St. praesens. Азисъ субъектъ крѣпкій и совершенно здоровый. Лобъ, за исключеніемъ бровей и надпереносья, бѣлый; на границѣ съ темной окраской остальнаго лица бѣлая окраска имѣетъ видъ пятнышекъ. Волоса на головѣ, усы и борода черные. Шея спереди—вверху—темная, внизу—темная полоска, идущая по тракту sterno-cleido-mastoidei правой стороны; сзади шея почти вся черная. Остальное тѣло—туловище и конечности—бѣлое.

10. Мырхамый-Мулла-Сюничай. (Табл. XV).

4) Мырхамый-Мулла-Сюничай, 71 года. Родина Маргеланъ. Родные здоровы. Былъ женатъ; но жена ушла отъ него, когда онъ заболѣлъ; имѣетъ двухъ дѣтей, оба живы и здоровы. Первое пятно (когда ?) обнаружилось на правомъ колѣнѣ. До появленія пятна и позднѣе былъ совершенно здоровъ.

St. praesens. На лбу, на бѣломъ фонѣ, обильныя темныя пятнышки; брови, носъ, щеки темнаго цвѣта съ бѣлыми пятнышками; голова бѣлая; волоса на головѣ, усы и борода сѣдые. На шеѣ сзади отдѣльныя, темныя пятнышки. Грудь и спина бѣлыя.

Конечности. На верхнихъ—пятна темныя находятся только на тылѣ предплечій и кистей рукъ, а именно—начиная съ нижней $^1/_4$ предплечій; на лѣвой сторонѣ пятна меньше и рѣже, на правой они крупнѣй. Нижнія конечности совсѣмъ бѣлыя, за исключеніемъ нѣсколькихъ темныхъ пятенъ на передней поверхности голеней.

11. Абдулла-Назаръ-Бай. (Табл. XV).

5) Абдулла-Назаръ-Бай, 39 лѣтъ. Сартъ Кокандскаго уѣзда. Родные здоровы. Заболѣлъ, когда ему было 19 лѣтъ. Первое пятно показалось на вискѣ, безъ всякихъ предвѣстниковъ. Женился 17 лѣтъ тому назадъ и живетъ съ женою, съ которою прижилъ 3 дѣтей; дѣти здоровы. Въ кишлакѣ 13 лѣтъ.

St. praesens. Субъектъ очень крѣпкій. Лице темное, за исключеніемъ бѣлой полоски въ верхней половинѣ лба; волоса на головѣ, помимо бѣлаго и сѣдаго пятна, величиною въ пятакъ, на лѣвой половинѣ затылка,—черные; таковаго же цвѣта усы и борода.

Шея спереди темнаго цвѣта, сзади такая окраска занимаетъ только середину выи. Грудь и спина бѣлая.

Конечности. Въ верхнихъ конечностяхъ темная окраска только подъ мышками; въ нижнихъ—въ области колѣнъ: спереди въ формѣ неправильныхъ пятенъ; съ внутренней стороны—на лѣвой ногѣ—въ видѣ небольшихъ пятнышекъ.

12. Абдыкадыръ-Уста-Майсуфъ. (Табл. XVI).

6) Абдыкадыръ-Уста-Майсуфъ, 51 года. Сартъ изъ Андижана. Болѣнъ съ дѣтства, а потому не помнитъ, гдѣ обнаружилось первое пятно. Въ кишлакѣ 10 лѣтъ. Женился на песевой и имѣетъ 3 дѣтей; дѣти здоровы.

St. praesens. Субъектъ очень крѣпкій. Бѣлыя пятна въ области обоихъ висковъ; волоса на головѣ, въ усахъ и бородѣ съ мелкой просѣдью; кромѣ того, на головѣ, въ отдѣльныхъ мѣстахъ бѣлыя и сѣдыя пятна. На шеѣ темныя пятна на бѣломъ фонѣ. На груди, соотвѣтственно manubrium темныя точки. Грудь и животъ бѣлые; на бѣлой же спинѣ, кой-гдѣ, буроватыя крапинки.

Конечности. Темная окраска, и то въ видѣ точекъ, осталась только въ сторонѣ обѣихъ колѣнъ спереди.

13. Матфазыль-Тарымъ-Куланъ. (Табл. XVII).

7) Матфазыль-Тарымъ-Куланъ, 30 лѣтъ. Узбекъ Андижанскаго уѣзда. Родные здоровы. Болѣнъ 9 лѣтъ. Въ кишлакѣ 3 мѣсяца. Первое пятно показалось на шеѣ и сначала медленно, затѣмъ быстро пятна разошлись по всему тѣлу. Женатъ не былъ.

St. praesens. Субъектъ крѣпкій. Въ верхней части лба, подлѣ волосъ, нѣсколько бѣлыхъ пятнышекъ, остальное лице, а также шея, темныя. Грудь, животъ и спина бѣлыя, за исключеніемъ нѣсколькихъ блѣдно-бурыхъ пятнышекъ въ области epigastrii и таковыхъ же пятенъ in regio supraspinata на спинѣ.

Конечности. На верхнихъ темная окраска удержалась подъ мышками, въ локтевомъ сгибѣ (въ видѣ узоровъ) и на тылѣ плечь. Въ нижнихъ конечностяхъ—темный узоръ въ области колѣнъ спереди.

14. Кази-Баба-Шарибай. (Табл. XVI).

8) Кази-Баба-Шарибай, 38 лѣтъ. Андижанскаго уѣзда. Родные всѣ здоровы. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ кишлакѣ махау находится 10 лѣтъ. Первое пятно явилось на спинѣ, затѣмъ на правой рукѣ, а потомъ пятна медленно разошлись по всему тѣлу. Женился въ кишлакѣ; жена больна песью же; имѣетъ 2-хъ совершенно здоровыхъ дѣтей.

St. praesens. Верхняя часть лба и передняя головы, не исключая висковъ, бѣлаго цвѣта съ сѣдыми волосами. Остальное лице темное; на задней половинѣ головы волоса черные, съ отдѣльными бѣлыми прядями. Усы и борода черные. Шея сзади темная съ 3 небольшими бѣлыми пятнышками; спереди шеи бѣлое пятно, помѣщающееся надъ самымъ manubrium. Темная окраска кожи шеи, обходя это послѣднее бѣлое пятно, спускается на грудину и занимаетъ верхнюю треть этой послѣдней; кромѣ того на груди только одно темное пятнышко, около лѣваго соска; животъ и спина бѣлые.

Конечности. Въ верхнихъ: темныя пятна подъ мышками и въ лѣвомъ локтевомъ сгибѣ; кромѣ того кисти рукъ темныя, за исключеніемъ бѣлыхъ пятенъ какъ на тылѣ кистей, такъ и 1-хъ фалангъ 3-го и 4-го пальцевъ. Въ нижнихъ конечностяхъ темная окраска въ видѣ пятенъ занимаетъ оба колѣна спереди, начинаясь съ нижней $^1/_3$ бедеръ; затѣмъ, въ видѣ темнаго узора она распространяется на голени сзади и на стопы, а именно—тылъ послѣднихъ.

15. Ташъ-Магометъ. (Табл. XVI).

9) Ташъ-Магометъ, 25 лѣтъ. Узбекъ изъ Коканда. Родные не болѣли. Болѣнъ 6 лѣтъ; въ кишлакѣ махау 2 года; ушелъ туда самъ отъ стыда. Болѣзнь началась, при полномъ здоровьѣ, съ пятна на спинѣ. Холостъ.

St. praesens Субъектъ очень крѣпкій. На лбу бѣлыя пятна, небольшія: одно около волосъ, надъ лѣвымъ вискомъ; другое около наружнаго конца правой брови; кромѣ того пятна на той и другой сторонѣ, около ушныхъ раковинъ. Голова пестрая: часть (бо́льшая) волосъ сѣдая, другая—темная, расположенная въ видѣ узора. Шея

темнаго цвѣта; только сзади 2 небольшихъ пятна. Темная окраска распространяется съ шеи на переднюю часть груди и занимаетъ среднюю верхнюю ея треть, давая отростки по направленію къ мышкамъ и соскамъ. На животѣ темная развѣтвляющаяся полоска in regio epigastrica. На спинѣ—только небольшія пятнышки in fossa supraspinata, она вся бѣлая.

Конечности. Темныя пятна подъ мышками и въ области головки плеча. Передняя и внутренняя поверхность плечъ бѣлая, задняя и часть наружной—темная. На тылѣ и ладонной поверхности предплечій бѣлыя пятна. Кисти рукъ темныя. На бедрахъ и въ сторонѣ колѣнъ снутри и сзади бѣлыя пятна; голени и стопы темныя.

16. Атматъ-Уста-Язматъ. (Табл. XVI).

10) Атматъ-Уста-Язматъ, 74 лѣтъ, изъ Коканда. Родственники здоровы. Болѣнъ 52 года; въ кишлакѣ махау находится 12 лѣтъ. Первое пятно появилась на мошонкѣ; въ теченіи 20 лѣтъ, новыхъ пятенъ не появлялось; спустя 20 лѣтъ появилось снова пятно, а именно на поясницѣ, и послѣ того пятна стали являться быстрѣе. Женился въ кишлакѣ махау на песевой.

St. praesens. На вискахъ и за ушами, а также въ отдѣльныхъ мѣстахъ на волосистой части головы небольшія бѣлыя пятна. Волоса на головѣ (короткія), а также внутренняя часть усовъ черные съ просѣдью. Борода сѣдая. Шея темная. Спереди темная окраска шеи спускается на грудь въ видѣ широкой полосы, занимающей область грудины; дойдя до средней ея трети, полоса расширяется и захватываетъ всю переднюю среднюю $^1/_3$ груди. почти до аксиллярной линіи; нижняя $^1/_3$ грудной клѣтки бѣлая, съ небольшими темными пятнышками. На животѣ темное пятно in regio epigastrica. Спина вся бѣлая, за исключеніемъ участка кожи въ сторонѣ spinae scapulae, куда темная окраска шеи спускается въ видѣ широкой полоски, идущей по верхнему краю trapezii и захватывающей область акроміальнаго отростка и головку плеча.

Конечности. На плечахъ, кромѣ указаннаго сейчасъ темнаго пятна, находится на передней поверхности темная неправильная полоса, расширяющаяся въ локтевомъ сгибѣ; сзади 2 нижнія $^1/_3$ плеча

темныя, также какъ и локти. На предплечіяхъ и кистяхъ бѣлые участки кожи занимаютъ 2 верхнія трети лучевой поверхности; затѣмъ, на лѣвой сторонѣ бѣлое пятно находится на ладонной поверхности нижней $^1/_3$ предплечія, а на правой такое же пятно въ средней трети; наконецъ бѣлыя пятна находятся на тылѣ кистей, на лѣвой большое, на правой—маленькое. Въ нижнихъ конечностяхъ: колѣна темнаго цвѣта (бедра ?); правая голень спереди бѣлая, за исключеніемъ нижней $^1/_3$; лѣвая спереди вся темная, за исключеніемъ бѣлаго пятна въ серединѣ; на наружныхъ поверхностяхъ голеней темныя пятна; сзади и свнутри цвѣтъ голеней бѣлый, также такъ и бо́льшая часть тыла стопъ, кромѣ ножныхъ пальцевъ.

17. Короидаръ-Дустъ-Магометъ. Табл. XVI).

11) Короидаръ-Дустъ-Магометъ, 57 лѣтъ. Таджикъ. Родные здоровы. Болѣнъ 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на поясницѣ, затѣмъ пятна разошлись по всему тѣлу. Первая жена, когда онъ заболѣлъ, бросила его; отъ нея онъ имѣетъ 7 человѣкъ дѣтей; по поступленіи въ махау-кишлакъ (3-й годъ) онъ женился тамъ на старухѣ, дѣтей отъ нея нѣтъ.

St. praesens. На головѣ, въ серединѣ темянной области, большое бѣлое пятно съ сѣдыми волосами, остальные волоса съ просѣдью, также какъ и усы и борода. Лице темное, тоже—шея. Съ этой послѣдней темная окраска кожи спускается въ видѣ полосы на грудь и животъ и захватываетъ и тотъ и другой, оставляя свободными, т. е.—бѣлыми, участки кожи: внутреннюю половину надъ и подключичной области; полоску кожи вдоль грудины, ниже manubrii; боковыя части груди и живота. Спина, за исключеніемъ очень рѣдкихъ темныхъ пятнышекъ,—бѣлая.

Конечности. Въ сторонѣ верхняго плеча темная окраска, также какъ и на задней и внутренней поверхности плечъ и области локтеваго сгиба. Предплечія и кисти: темная окраска ладонной поверхности, до нижней трети, гдѣ окраска бѣлая достигаетъ до ладоней, представляющихъ темный цвѣтъ; на предплечіяхъ, кромѣ того, бѣлыя небольшія пятна въ средней трети; на тыльной сторонѣ бѣлая окраска локтей достигаетъ на правой сторонѣ половины

предплечія, на лѣвой же—спускается по лучевой сторонѣ до нижней трети; на тылѣ кистей и пальцевъ бѣлыя пятна: на правой очень мелкія, на лѣвой—крупныя. Въ нижнихъ конечностяхъ: темная окраска въ области колѣнъ, на лѣвой сторонѣ—поднимающаяся до средней $^1/_3$ бедра; сзади окраска эта начинается на той и другой сторонѣ на уровнѣ нижней $^1/_3$ бедра и спускается на лѣвой сторонѣ на голень, окрашенную, помимо отдѣльныхъ пятенъ въ темный цвѣтъ; на правой сторонѣ сзади и спереди голеней, кожа, помимо отдѣльныхъ темныхъ пятенъ и полосъ, бѣлаго цвѣта; внутренняя поверхность стопъ темная, наружная—бѣлая.

У Короидара, кромѣ того, обильное количество волосъ на туловищѣ и конечностяхъ (homo pilosus). Волоса эти, хотя и съ мелкой просѣдью, остаются тѣмъ—неменѣе черными и въ большинствѣ бѣлыхъ пятенъ и даже на спинѣ.

18. Мухаметъ-Аминь. (Табл. XVII).

12) Мухаметъ-Аминь, 54 лѣтъ. Узбекъ Маргеланскаго уѣзда. Родители песью не болѣли. Болѣнъ 15 лѣтъ, въ кишлакѣ 1 годъ, пришелъ сюда самъ. Первое пятно обнаружилось на животѣ. Женатъ, имѣетъ 6 человѣкъ дѣтей. Жена осталась дома.

St. praesens. Лобъ бѣлый; на волосистой части головы отдѣльныя бѣлыя и сѣдыя пятнышки; борода и усы черные. Лице и шея темныя. Середина груди и область надъ сосками густо усѣяна темными пятнышками; надъ и подключичныя области бѣлыя; ниже линіи сосковъ окраска бѣлая; въ верхней части живота—темная съ краевыми, темными же, пятнышками. На спинѣ темная окраска, въ видѣ густыхъ темныхъ пятнышекъ, занимаетъ fossam supraspinatam и внутренній край лопатокъ; остальная спина и поясница бѣлая.

Конечности. Область deltoidei темная, bicipitis бѣлая, тылъ плечъ опять темный съ бѣлыми пятнышками, также какъ и локти и локтевая складка спереди. На предплечіяхъ темные узоры на ладонной сторонѣ (болѣе широкіе на правой сторонѣ); ладони темнаго цвѣта; тылъ предплечій бѣлый съ рѣдкими темными пятнышками; тоже и тылъ кистей и пальцевъ на правой сторонѣ; на лѣвой—бѣлой окраски меньше. На нижнихъ конечностяхъ: темныя пятна въ сторонѣ колѣнъ спереди; голени же и тылъ стопъ мраморные.

19. Борза-Махсудъ-Мулла-Хасанбай. (Табл. XV).

13) Борза-Махсудъ-Мулла-Хасанбай, 64 лѣтъ, изъ Маргелана. Родители здоровы. Болѣнъ 30 лѣтъ, въ кишлакѣ находится 12. Въ началѣ появились два пятна на двухъ симметрическихъ точкахъ живота.

St. praesens. На волосистой части головы крупныя бѣлыя пятна; лице темное, усы и борода совершенно бѣлые; шея и уши темные. Грудь и животъ почти совсѣмъ бѣлые, за исключеніемъ мелкихъ темныхъ точекъ подъ сосками и темноватой окраски reg. epigastricae. Спина вся усѣяна мелкими темными точками, причемъ въ центрѣ каждой точки помѣщается темный же волосокъ. Гуще точки эти расположены надъ поясничной областью и на ягодицахъ, въ другихъ мѣстахъ они рѣдки.

Конечности. Ладонная поверхность плечь, предплечій и кистей бѣлая; тылъ крапчатый, а въ кистяхъ почти темный—съ небольшими бѣлыми пятнышками. Колѣна спереди представляютъ темную крапчатую окраску. Голени и спереди и сзади почти бѣлыя, крапинокъ немного, ихъ больше только около голенно-стопнаго сочлененія. Стопы бѣлаго цвѣта.

20. Зунумъ-Бай-Муста-Ходра. (Табл. XV).

14) Зунумъ-Бай-Муста-Ходра, 53 лѣтъ. Уроженецъ Кашгара. Родные здоровы. Заболѣлъ 13-ти лѣтъ отъ роду, въ кишлакѣ махау 5 лѣтъ. Первое пятно показалось на поясницѣ, на серединѣ; затѣмъ—на правой ступнѣ, а позднѣе въ разныхъ мѣстахъ тѣла. Живетъ съ женою изъ Кашгара, она здорова, прижила съ нимъ двухъ дѣтей: одному 13, другому 5 лѣтъ; оба здоровы.

St. praesens. Волосистая часть головы бѣлаго цвѣта съ черными, рѣже сѣдыми волосами; лице темное; усы и борода густые полусѣдые. Шея темная. Надъ и подключичныя пространства бѣлыя. Грудь спереди и животъ темнаго цвѣта, съ разсѣянными бѣлыми пятнами, а именно соотвѣтственно соскамъ и на боковыхъ частяхъ груди и живота. Спина мраморная; болѣе крупныя бѣлыя пятна на-

ходятся около шеи, у наружнаго угла лопатокъ и на боковыхъ частяхъ спины; поясница вся бѣлая.

Конечности. Ладонныя поверхности плечъ, предплечій и кистей темныя, съ довольно рѣдкими небольшими пятнами; на тылѣ два большихъ бѣлыхъ пятна, а именно на предплечіяхъ: оба начинаются нѣсколько выше локтя и кончаются около средины предплечій; кромѣ того, нѣсколько малыхъ пятенъ на кистяхъ и пальцахъ. Въ нижнихъ конечностяхъ: бѣлая окраска верхней $^1/_3$ бедеръ и бѣлыя небольшія пятна подъ правымъ колѣномъ и на тылѣ обѣихъ стопъ.

21. Рустанъ-Раджабъ-Али. (Табл. XVII).

15) Рустанъ-Раджабъ-Али, 35 лѣтъ. Самаркандскаго уѣзда. Родственники здоровы. Болѣнъ 21 годъ; въ кишлакѣ махау 9 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась бѣлымъ пятномъ на спинѣ, затѣмъ медленно стали являться пятна и на другихъ частяхъ тѣла.

Sr. praesens. Лице темное, только около волосъ на лбу, кой-гдѣ, блѣдныя пятна. Шея темная. Съ шеи темная краска спускается на грудь и плечи, оставляя свободными (бѣлыми) двѣ полосы кожи около середины ключицы; полосы эти распространяются вверхъ in fossa supra—и внизъ in fossa infraclavicularis; вся средняя часть груди темная—кое-гдѣ бѣлыя пятна—тоже и верхняя половина живота; боковыя части груди бѣлыя. На спинѣ нижняя граница темнаго рисунка изображаетъ букву W, причемъ оба нижнія колѣна буквы доходятъ до поясницы, совершенно бѣлой. Вверху, соотвѣтственно вершинѣ средняго колѣна, на линіи 1-хъ грудныхъ позвонкомъ находится большое бѣлое пятно (первое); нѣсколько небольшихъ пятенъ разсѣяны отдѣльно по темному фону спины.

Конечности. Средняя, приблизительно, треть ладонной и почти вся наружная поверхность плеча бѣлаго цвѣта; наоборотъ, тыльная и внутренняя поверхность окрашена, помимо отдѣльныхъ бѣлыхъ пятенъ, темнымъ цвѣтомъ. Тылъ и внутренняя поверхность предплечій бѣлаго цвѣта, ладонная же и наружная поверхности, за исключеніемъ нижней $^1/_3$, также какъ и ладони—темныя. Нижнія конечности, начиная съ половины бедеръ, темнаго цвѣта съ бѣлыми пятнами; тылъ стопъ бѣлый,

22. Мулла-Бабадранъ-Ибрагимъ-Бай (Табл. XVI).

16) Мулла-Бабадранъ-Ибрагимъ-Бай, 54 лѣтъ. Изъ Намангана. Родители здоровы. Болѣнъ 28 лѣтъ; въ кишлакѣ—махау 6 лѣтъ; ушелъ сюда самъ, когда узнали, что онъ болѣнъ. Первое пятно появилось на большомъ пальцѣ лѣвой руки. Женатъ, жена здорова, пришла съ нимъ въ пріютъ; имѣетъ 6 дѣтей: всѣ здоровы.

St. praesens. Лице темное; волоса на головѣ, усахъ и бородѣ съ просѣдью. Шея темная. Кругомъ ея бѣлыя пятна, а именно—въ надъ—и подключичной впадинѣ и на спинѣ. На груди бѣлая полоса, напомнинающая букву Т. Верхній конецъ этой полосы соотвѣтствуетъ средней $^1/_3$ грудины, нижній—доходитъ до мечевиднаго отростка; кромѣ того, бѣлыя пятна на лѣвомъ соскѣ и въ правой подчревной области. На спинѣ бѣлыя пятна in reg. supraspinata; далѣе—спина до поясницы темная, съ небольшими бѣлыми пятнышками и однимъ большимъ пятномъ, на боковой части груди. Поясница бѣлая.

Конечности. Верхнія конечности тенаго цвѣта съ бѣлыми пятнами: въ верхней части предплечій, на лучевой ихъ половинѣ; на ладонной поверхности предплечій въ нижней $^1/_3$; на тылѣ кистей и первыхъ фалангъ большаго и другихъ пальцевъ. Нижнія конечности: бедра и голени темнаго цвѣта; на послѣднихъ спереди небольшія бѣлыя пятна; на тылѣ стопъ довольно крупныя бѣлыя пятна.

23. Пиръ-Назаръ (Табл. XVII).

17) Пиръ-Назаръ, 63 лѣтъ. Изъ Каршей (въ Бухарскихъ владѣніяхъ) Родные не болѣли. Болѣнъ 43 года; въ кишлакѣ-махау 24 года (прежде въ Кокандскомъ, а позднѣе здѣсь). Первое пятно явилось на поясницѣ. Женатъ здѣсь на песевой и имѣетъ 2-хъ дѣтей: одному 4, другому 2 года.

St. praesens. Лице темное; волоса на головѣ, усахъ, бородѣ почти совсѣмъ сѣдые. Шея темная также какъ и передняя часть груди, исключая пятенъ въ области ключицъ и начинающей блѣднѣть полоски кожи на грудинѣ. Боковыя части, груди, кромѣ мышекъ бѣлыя. Спина темная, до поясницы, совершенно бѣлой.

Конечности. Бѣлая окраска предплечій, а именно на тылѣ: на правой сторонѣ около локтя, на лѣвой на всемъ протяженіи, но только на локтевой половинѣ; на ладонной поверхности бѣлая окраска занимаетъ только нижнюю треть предплечій, откуда распространяется на кисти. Эти послѣднія, за исключеніемъ большого пальца и кожи покрывающей тылъ 1-ой—4-ой пястныхъ костей—бѣлаго цвѣта. Въ нижнихъ конечностяхъ: темная окраска удержалась въ области колѣнъ спереди и сзади, и въ видѣ небольшихъ и рѣдкихъ точекъ на голеняхъ.

24. Норъ-Магометъ-Яръ-Магометъ. (Табл. XVII).

18) Норъ-Магометъ-Яръ-Магометъ, 56 лѣтъ; Кокандскаго уѣзда. Родные здоровы. Болѣнъ 30 лѣтъ; въ кишлакѣ-махау 4 года. Первое пятно обнаружилось на лѣвомъ бедрѣ, черезъ 10 лѣтъ явилось новое пятно (?), а еще черезъ 10 на спинѣ; въ послѣднее время каждый годъ является по одному пятну. Женатъ 3-й разъ уже здѣсь, дѣтей нѣтъ.

St. praesens. Лице темное; волоса сѣдые. Шея темная. На груди пятна небольшія, а именно въ области ключицъ, надъ и подъ ними; очень маленькія пятна (по одному на каждой сторонѣ) кнаружи отъ сосковъ; правый сосокъ бѣлый. На спинѣ 2 большихъ пятна въ надлопаточныхъ областяхъ и два (по одному на каждой сторонѣ) на поясницѣ.

Конечности. Бѣлыя пятна на плечахъ спереди: на правой сторонѣ 2, очень небольшія, около локтеваго сгиба; на лѣвой 3 довольно крупныя: одно около мышки, другое кнаружи отъ него и наконецъ третье тамъ же, гдѣ и на правой сторонѣ. Въ нижнихъ конечностяхъ, кромѣ обильныхъ бѣлыхъ пятенъ на тылѣ стопъ два небольшихъ пятнышка на передней поверхности правой голени.

25. Кушуакъ-Султанъ-Бай. (Табл. XVII).

19) Кушуакъ-Султанъ-Бай, 25 лѣтъ. Самаркандскаго уѣзда. Родственники здоровы. Болѣнъ 5 лѣтъ. Въ кишлакѣ махау 3 года. Холостъ. Первое пятно появилось на поясницѣ по серединѣ; затѣмъ—на спинѣ и груди.

St. praesens. Лице и шея темныя. На груди, спереди, на правой сторонѣ, въ серединѣ ключицы маленькое бѣлое пятнышко; на лѣвой такое же, бо́льшей величины и еще одно надъ, а другое подъ нимъ; кромѣ того, еще два пятна: одно на линіи соединяющей соски, на грудинѣ, въ мѣдный пятакъ; другое, меньше, подъ нимъ. На спинѣ бѣлая окраска въ формѣ креста: верхній конецъ приходится около шеи, захватываетъ часть надлопаточныхъ областей; боковыя вѣтви креста помѣщаются въ видѣ довольно широкихъ, неправильныхъ полосъ подъ нижними углами лопатокъ; нижній конецъ тоже въ видѣ широкой полосы распространяется на поясницу; кромѣ того, около сказанной фигуры разсѣяны отдѣльныя небольшія пятна.

Конечности. Бѣлыя пятна есть только на лѣвомъ плечѣ: одно спереди, надъ локтевымъ сгибомъ; другое сзади, надъ внутреннимъ мыщелкомъ, и третье вверху въ области deltoidei. Нижнія конечности темнаго цвѣта.

26. Ширъ-Али-Аширъ-Али. (Табл. XVI).

20) Ширъ-Али-Аширъ-Али, 49 лѣтъ. Маргеланскаго уѣзда. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ кишлакѣ-махау 13; первые 7 лѣтъ скрывалъ свою болѣзнь. Первое пятно показалось на поясницѣ. Женатъ 2 раза: первая жена бросила его, отъ нея онъ имѣетъ 2-хъ дѣтей, дѣти здоровы; вторая жена, песевая тоже, имѣетъ 2 дѣтей.

St. praesens. Лице темное. На головѣ въ серединѣ бѣлое большое пятно съ сѣдыми волосами; въ усахъ и бородѣ просѣдь. Шея темная. На груди, около шеи, въ надъ и подключичныхъ пространствахъ бѣлая довольно широкая полоса. На спинѣ нѣсколько небольшихъ пятенъ: одно на поясницѣ въ серединѣ, продолговатой формы; нѣсколько пятнышекъ на боковыхъ частяхъ груди и на правой лопаткѣ и одно пятно около шеи.

Конечности. Бѣлыя пятнышки около мышекъ; довольно большое пятно на ладонной поверхности лѣваго плеча, въ верхней части брюшка bicipitis; наконецъ, по одному бѣлому, довольно большому пятну находится на ладонной поверхности предплечій, около сочлененія съ кистью; на кистяхъ разсѣяны бѣлыя пятнушки на тылѣ. На нижнихъ конечностяхъ бѣлыя пятнышки: на правомъ ко-

лѣвѣ сзади; на голеняхъ спереди и снаружи (болѣе на лѣвой сторонѣ); большія бѣлыя пятна на тылѣ стопъ.

27 Игимъ-Берды. (Табл. XVI).

21) Игимъ-Берды, 60 лѣтъ. Изъ Коканда. Родители не болѣли. Болѣнъ 44 года, въ кишлакѣ 14 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на лѣвомъ плечѣ, затѣмъ второе—позднѣе (когда?)—на правомъ. Былъ женатъ 2 раза; одна жена умерла, другой далъ разводъ. Имѣетъ 4-хъ дѣтей, всѣ здоровы.

St. praesens. Лице темное; волоса съ мелкой просѣдью. Пятна бѣлыя, большія въ наружней половинѣ надъ и поключичныхъ пространствъ той и другой стороны, распространяющіяся къ мышкамъ. На спинѣ узоръ бѣлыхъ пятенъ въ верхней части спины; два узорчатыхъ же, но небольшихъ пятна на лѣвой лопаткѣ и большое пятно, въ видѣ полосы, на поясницѣ.

Конечности. Верхнія: бѣлыя пятна на наружной поверхности плечъ, въ серединѣ; большія бѣлыя пятна въ сторонѣ локтей, сзади; бѣлое довольно большое пятно около сочлененія кисти на ладонной поверхности праваго предплечія. Нижнія: бѣлыя пятнышки на лѣвой голени сзади и крупныя пятна на тылѣ стопъ.

28. Мулла-Махметъ-Мулла-Ходра-Назаровъ. (Табл. XV).

22) Мулла-Махметъ-Мулла-Ходра-Назаровъ, 64 лѣтъ, изъ Коканда. Родители здоровы. Болѣнъ 38 лѣтъ, въ кишлакѣ махау 14 лѣтъ. Первое пятно показалось у шеи, справа. Женатъ 2 раза: первая жена, отъ которой онъ имѣлъ 10 человѣкъ дѣтей (5 умерло), бросила его и живетъ въ Кокандѣ, на 2-ой онъ женился въ кишлакѣ-махау, она несевая; у нея отъ Назарова 2-ое дѣтей: старшему 13, младшему 6 лѣтъ. Дѣти здоровы.

St. praesens. Волоса съ сильной просѣдью; на головѣ и шеѣ пятна только на ушахъ сзади и около нихъ. На груди группа мелкихъ пятнышекъ около шеи, въ надъ и подключичныхъ областяхъ, и одно небольшое пятно въ серединѣ грудины. На спинѣ небольшое коли-

чество мелкихъ пятнышекъ, а именно въ сторонѣ лѣвой лопатки и на поясницѣ.

Конечности. Узорчатыя пятна на ладонной поверхности предплечій, около сочлененія кисти, и такія же на голени спереди.

Въ томъ же кишлакѣ еще трое песевыхъ ушли просить милостыню. Песевыя женщины не могли быть осмотрѣны подробно.

29. (23) Турда-Агача, 72 л. изъ Кашгара, откуда выѣхала 17-ти лѣтъ. Родители не болѣли. Больна 40 лѣтъ; заболѣла въ Маргеланѣ; въ кишлакѣ 4 года; первое пятно показалось на серединѣ спины. Была замужемъ имѣла 2 дѣтей; здѣсь снова вышла замужъ.

St. praesens. На лицѣ, щекахъ и лбу—темныя пятна на бѣломъ фонѣ. Вся бѣлая (ея указанія).

30. (24) Саидъ-Биби, 68 л. Изъ Маргелана. Родственники не болѣли. Больна болѣе 40 лѣтъ, въ кишлакѣ махау 13 лѣтъ. Первое пятно явилось на спинѣ. Замужемъ; дѣтей нѣтъ.

St. praesens. Бѣлыя пятна на лбу и лѣвой щекѣ, а также на рукахъ. Почти вся бѣлая.

31. (25) Халора-Биби, 68 лѣтъ. Андижанскаго уѣзда. Родители и родственники здоровы. Больна 12 лѣтъ; въ кишлакѣ махау 10. Первое пятно явилось на правомъ предплечіи. Замужемъ.

St. praesens. Лице темное. На рукахъ бѣлыя пятна. На тѣлѣ ихъ много.

32. (26) Ортадронъ-Биби, 39 лѣтъ. Маргеланскаго уѣзда. Больна 31 годъ, въ кишлакѣ махау 13 лѣтъ. Родители здоровы. Первое пятно явилось на поясницѣ. Замужемъ здѣсь; двое дѣтей.

St. praesens. Лице темное. Бѣлыхъ пятенъ на тѣлѣ много.

33. (27) Ханымъ-Биби, 68 лѣтъ. Изъ Намангана. Родные не болѣли. Больна 53 года; въ кишлакѣ махау 10 лѣтъ. Первое пятно на груди, а потомъ медленно пошли по всему тѣлу.

St. praesens. Темныя пятна на бѣломъ лицѣ. Тѣло почти все бѣлое.

34. (28) Курванъ-Биби, 35 лѣтъ. Изъ Андижана. Больна 25 лѣтъ; въ кишлакѣ-махау 14. Первое пятно явилось на шеѣ спереди. Замужемъ здѣсь, имѣетъ 1 ребенка Родные не болѣли.

St. praesens. Лице темное, руки и шея въ бѣлыхъ пятнахъ. На тѣлѣ много пятенъ.

35. (29) Ташъ-Биби, 30 лѣтъ. Андижанскаго уѣзда. Больна 11 лѣтъ, въ кишлакѣ-махау, куда ее прогналъ 1-й ея мужъ, 9 лѣтъ. Первое пятно показалость надъ подбородкомъ. Мужъ—Аксакалъ (263). Имѣетъ ребенка.

St. praesens. Лйце темное. Бѣлое пятно надъ подбородкомъ и на шеѣ спереди. На рукахъ и ногахъ (голеняхъ) пятенъ нѣтъ. На тѣлѣ пятенъ много.

36. (30) Нусретъ, 32 л. Самаркандскаго уѣзда. Родные не болѣли. Больна 16 лѣтъ, въ махау кишлакѣ 10. Первое пятно обнаружилось на шеѣ слѣва.

St. praesens. На лицѣ, рукахъ и ногахъ пятенъ нѣтъ. На тѣлѣ есть, довольно много.

37. (31) Хвижеса, 30 лѣтъ. Маргеланскаго уѣзда. Больна 20 лѣтъ, въ кишлакѣ 5. Первое пятно явилось на поясницѣ, затѣмъ на спинѣ.

St. praesens. Лице, руки и ноги темныя. На тѣлѣ пятенъ немного.

38. (32) Ходжаль-Биби, 30 лѣтъ. Изъ г. Андижана. Родные здоровы. Больна 10 лѣтъ; здѣсь 8 лѣтъ. Первое пятно—на спинѣ.

St. praesens. Лице темное; на рукахъ и ногахъ бѣлыя пятна. На тѣлѣ много.

39. (33) Хейтъ-Биби, 31 года. Маргеланскаго уѣзда. Отецъ, мать и родные не болѣли. Больна 20 лѣтъ. Во кишлакѣ-махау, куда ее насильно вытащили изъ дому песевые, 5-ть лѣтъ; она не хотѣла идти и долго плакала, теперь привыкла, вышла замужъ имѣетъ 1 ребенка. Первое пятно явилось на шеѣ и пятна быстро разбросало по тѣлу.

St. praesens. Лице темное; на рукахъ и ногахъ пятна. На тѣлѣ пятенъ много.

40. (34) Гульдсумъ-Биби, 45 лѣтъ. Чустскаго уѣзда. Больна 25 лѣтъ, въ кишлакѣ 12 л. Первое пятно на вѣкѣ.

St. praesens. Лице темное. На рукахъ и ногахъ пятна. На тѣлѣ пятенъ много.

TAFEL XV' und XV''.

№ 263. Der Aksakal (Aelteste) des Kischlak-Machau in Andidzan besitzt die normale Hautfärbung der Eingeborenen.

№ 8. Madjar-Mamandram Bey. 58 a. n. Seit 30 Jahren krank, befindet sich seit 25 Jahren in dem Kischlak. Der erste Fleck trat in der Gürtelgegend auf. Nach 10 Jahren war er ganz weiss geworden. Kinder sind gesund.

№ 7. Nor Mahomet 65 a. n. Der erste Fleck auf der Mitte der Brust, nach etwa 10 Jahren war N. ganz weiss geworden. Frau und Kinder (15, davon leben 8) sind gesund. Er selbst erfreut sich der besten Gesundheit.

№ 28. Mullah-Mahmet 64 a. n. Seit 38 Jahren erkrankt. Wohnt seit 14 Jahren im Kischlak; ist mit einer Vitiligo—Kranken verheirathet, die ihm 2 Kinder geboren hat, eines ist 13, das andere 6 Jahre. Dieselben sind gesund. Ebenso sind 5 Kinder von der ersten Frau, die ihn, als er krank wurde, verliess, gesund.

Stat. praes. Abgesehn von den weissen Flecken (cf. Abbild.) ist er ganz gesund.

№ 10. Mirchameji. 71 a. n. Der erste Fleck trat (wann?) auf dem rechten Knie auf. Sonst gesund.

№ 19. Borsa-Maschud. 64 a. n. Seit 30 Jahren krank, seit 12 Jahren in der Ansiedelung. Die ersten Flecke traten auf symetrischen Punkten des Abdomens auf. Sonst ganz gesund.

№ 20. Susun Bey. 53 a. n., aus Kaschgar, erkrankte vor 13 Jahren. In der Ansiedelung seit 5 Jahren. Auch seine Frau ist aus Kaschgar und, ebenso wie seine 2 Kinder, gesund. Die ersten Flecke traten an der Hüfte auf.

№ 11. Abdhulla-Nasar Bey 39 a. n. Seit 20 Jahren krank, im Kischlak befindet er sich seit 13 Jahren. Der erste Fleck trat an der Schläfe auf. A. ist verheirathet, die Frau und ihre 3 Kinder sind gesund.

Andidzan. 1885.

N°	11.	20	19.	10.	28	7.	8	263

Фотогр. съ натуры Г. Минхъ.

Фото-Гравюра Шерер, Набгольцъ и К° въ Москвѣ

TAFEL XVI und XVI'.

№ 27. Igim Berdi. 60 a. n. Seit 44 Jahren krank, in der Niederlassung seit 14 Jahren; der erste Fleck auf dem linken Oberarm. War verheirathet; die Kinder, 4 an der Zahl, sind gesund.

№ 14. Kasi-Baba. 38 a. n. Seit 20 Jahren krank, im Kischlak seit 10 Jahren. Der erste Fleck auf dem Rücken. Ist mit einer Vitiligo—Kranken verheirathet; die Kinder sind gesund.

№ 16. Atmat Usta. 74 a. n. Seit 52 Jahren krank; der erste Fleck trat auf dem Scrotum auf; im Laufe von 20 Jahren traten keine neuen Flecke auf; dann erschienen aber wieder welche, nämlich—auf der Lenden-Gegend, und jetzt traten die neuen in kürzeren Intervallen auf.

№ 15. Tasch Mahomet. 25 a. n. Seit 6 Jahren krank; in der Niederlassung seit 2 Jahren; die Scham trieb in dorthin. Der erste Fleck trat an der Lenden-Gegend auf.

№ 12. Abdikadir. 51 a. n. Von Kindheit an krank, in der Ansiedelung seit 10 Jahren; er erinnert sich nicht, wo der erste Fleck auftrat. Seine Frau ist eine Vitiligo—Kranke; ihre 2 Kinder sind gesund.

№ 17. Koroidar-Dust-Mahomet. 57 a. n. Seit 20 Jahren krank; in der Niederlassung seit 3 Jahren. Der erste Fleck an der Lenden-Gegend. Er war verheirathet, seine Frau hat ihn, als er krank wurde, jedoch verlassen; er hatte von ihr sieben gesunde Kinder.

Stat. praesens: Homo pilosus. Die Haare auf den Flecken sind theils weiss, theils schwarz.

№ 26. Schir-Ali. 49 a. n. Seit 20 Jahren krank; in der Ansiedelung seit 13 Jahren; 7 Jahre hat er seine Kankheit verheimlicht. Der erste Fleck an der Lenden-Gegend. Zweimal verheirathet: die erste Frau verliess ihn, die zweite ist Vitiligo—krank. Von beiden Frauen hatte er 4 gesunde Kinder.

№ 22. Mullah-Babadran. 54 a. n. Seit 28 Jahren krank; in der Niederlassung (welche er, als man erfuhr, dass er an Vitiligo erkrankt sei, aus eigenem Antriebe aufsuchte) befindet er sich seit 6 Jahren; der erste Fleck erschien auf dem linken Daumen. Seine Frau ist gesund; seine 6 Kinder gleichfalls.

Andidzan. 1885.

N°	27.	14.	16.	15.	12.	17.	26.	22.

Фотогр. съ натуры Г. Минхъ.

Фото-Гравюра Шереръ, Набгольцъ и К° въ Москвѣ.

№	27.	14.	16.	15.	19.	17.	86.	88.

TAFEL XVII und XVII'.

№ 25. Kuschouack Sultan. 25 a. n. Seit 5 Jahren krank, in der Ansiedelung 3 Jahre; der erste Fleck an der Lenden-Gegend. Unverheirathet.

№ 9. Azis-Bey. 44 a. n. Seit 30 Jahren krank. Der erste Fleck auf der rechten Gesässbacke. Das weitere Auftreten der Flecke erfolgte sehr langsam. Die Frau (von Vitiligo kranken Eltern stammend) und ihre 6 Kinder sind gesund.

№ 13. Matphasil. 30 a. n. Seit 9 Jahren krank; in der Ansiedelung seit 3 Monaten. Der erste Fleck auf dem Halse. Daraufhin entwickelten sich die Flecke anfangs langsam, dann aber in schnellerem Tempo auf dem ganzen Körper.

№ 18. Mahomed-Amin. 54 a. n. Seit 15 Jahren krank, im Kischlak-Machau seit 1 Jahre. Der erste Fleck auf dem Abdomen. Seine Frau und 6 Kinder sind gesund.

№ 21. Rustem-Radschab-Ali. 35 a. n. Seit 21 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 9 Jahren. Der erste Fleck auf dem Rücken; diesem folgten allmälig Flecke auch auf anderen Körperpartieen.

№ 24. Nor Mahomet. 56 a. n. Seit 30 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 4 Jahren. Der erste Fleck auf dem linken Oberschenkel; nach 10 Jahren trat ein neuer Fleck auf und abermals nach 10 Jahren wieder ein Fleck auf dem Rücken. In den letzten Jahren erschien alljährlich ein neuer Fleck. Verheirathet. Kinderlos.

№ 23. Pir Nasar. 63 a. n. Aus Karschi (Buchara). Seit 43 Jahren krank; in der Ansiedelung seit 24 Jahren. Erster Fleck—an der Lenden-Gegend. Mit einer Vitiligo—Kranken verheirathet. Zwei Kinder von 4 und 2 Jahren.

Andidzan. 1885.

N°:	25.	9.	13.	18.	21.	24.	23.

Фотогр. съ натуры Г. Минхъ.

Фото-Гравюра Шерера, Набгольцъ и К°въ Москвѣ

TAFEL XVIII. Fig. 1 und 2.

Koroidar-Dust-Mahomet. cf. Taf. XVI № 17.

Andidzan. 1885.

Taf. XVIII. 1, 2.

НАМАНГАНЪ.

Наманганъ, также какъ и Чустъ, уѣздные города ферганской области, находятся на правомъ берегу Сыръ-Дарьи. Пріютовъ для прокаженныхъ и песевыхъ въ этихъ уѣздахъ нѣтъ, а больные подвергаются или домашней изолировкѣ, или уходятъ въ пріюты лѣваго берега Дарьи. Осмотръ больныхъ въ Наманганѣ производился въ сартской лечебницѣ для приходящихъ и вмѣстѣ больницѣ; въ Чустѣ—въ помѣщеніи уѣзднаго начальника. И въ Наманганѣ и Чустѣ я пользовался любезнымъ содѣйствіемъ д-ра Благовѣщенскаго.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

---

264. Карахаджа-Камиль-Хаджа.

Карахаджа-Камиль-Хаджа, 29 лѣтъ. Сартъ, Наманганецъ. Изъ родныхъ болѣла бабка по отцу и умерла около 30 лѣтъ тому назадъ. Живетъ въ Наманганѣ только зимою, а лѣтомъ въ своемъ собственномъ саду въ Наматжанѣ.

Anamnesis. Болѣнъ, какъ говоритъ, 6 лѣтъ. Болѣзнь началась съ чесотки по всему тѣлу, пятенъ не было, а потомъ сталъ болѣть носъ, который провалился года 3 тому назадъ. Съ женщинами послѣднее сношеніе имѣлъ 5 лѣтъ тому назадъ: импотентъ.

St. praesens. Лицо пухлое, довольно темное. Инфильтратъ плотный, неясно узловатый. Отсутствіе волосъ на бровяхъ и рѣсницахъ полное; въ бородѣ и усахъ отдѣльные пучки. Носъ ввалился. На мягкомъ нёбѣ широкая узловатая полоса; въ срединѣ языка крупные узлы, а по краямъ бѣлыя, нѣсколько углубленныя, сосочковыя пятна, съ соотвѣтствующими имъ глубокими узелками.

Туловище. Пятенъ ни на груди, ни на спинѣ нѣтъ. Гиперестезія. Corona glandis инфильтрована; на мошонкѣ папулы (въ нижней половинѣ); epididimis той и другой стороны узловато утолщенъ.

Верхнія конечности. Довольно мягкій, неясно узловатый инфильтратъ плечъ. На лѣвомъ локтѣ сухая красная язва, величиною въ пятакъ, съ возвышенными рѣзкими инфильтрованными края-

ми. На тылѣ предплечій узловатыя четки по тракту венъ. Кожа тыла правой кисти утолщена, тверда; мышечной атрофіи и контрактуръ нѣтъ; на лѣвой сторонѣ инфильтрата нѣтъ, но рѣзко выраженная атрофія мышцы и довольна сильная контрактура мизинца, менѣе сильная—въ 4 и слабая 2-го и 3-го пальцевъ. Анестезія и аналгезія ниже локтей, хотя и безпорядочная.

Нижнія конечности. Склерозъ и утолщеніе кожи голеней спереди и обильные рубцовые слѣды pemphigus. Тоже въ стопахъ. Обильное шелушеніе. На подошвахъ прободающія язвы. Анестезія и аналгезія ниже колѣнъ, безпорядочная.

$18\,^{14}/_{VI}\,85$ г.

ПЕСЕВЫЕ.

---

41. Саидъ-Ахматъ-Хаджа-Косымъ-Хаджа.

1) Саидъ-Ахматъ-Хаджа-Косымъ-Хаджа, 45 лѣтъ. Изъ Кашидама, живетъ въ Наманганѣ. Изъ родныхъ никто не болѣлъ песью. Болѣзнь началась 30 лѣтъ тому назадъ. Первое пятно показалось на внутренней сторонѣ праваго плеча и затѣмъ, въ теченіи 10 лѣтъ, онъ почти весь побѣлѣлъ. Предъ появленіемъ пятна и послѣ былъ совсѣмъ здоровъ. Женатъ 13 лѣтъ; у жены также пятна, которыя были у нея еще до замужества. Ребенокъ одинъ, 5 лѣтъ, здоровъ. Живетъ у себя дома, въ общемъ кварталѣ. Нѣкоторые жители принимаютъ его, подаютъ ему руку, другіе—нѣтъ. Раньше жилъ въ разныхъ мѣстахъ: Маргеланѣ, Кокандѣ.

St. praesens. Нормальная окраска на лицѣ и шеѣ, но въ видѣ отдѣльныхъ пятенъ. Затѣмъ таже (темная) окраска находится: на тылѣ кистей рукъ; на лѣвой ягодицѣ въ видѣ темнаго пятна, въ мѣдный пятакъ; на головкѣ ствола и мошонкѣ. Волоса и на бѣлыхъ мѣстахъ черные, сѣдыхъ—нѣтъ.

42. Даливай-Сактвай-Хаджа.

2) Даливай-Сактвай-Хаджа, 47 лѣтъ, Наманганецъ. Въ семьѣ только онъ одинъ болѣнъ песью, остальные здоровы. Песь по-

явилась лѣтъ 15—16 тому назадъ, въ видѣ пятна величиною въ горошину, на ладонной поверхности лѣваго предплечія, около кисти; черезъ 3 года такое же пятно обнаружилось на соотвѣтствующемъ мѣстѣ другой стороны. До и послѣ появленія пятенъ былъ здоровъ. Жена умерла, песью не болѣла, ребенокъ (одинъ) здоровъ. Женился до болѣзни; когда обнаружилась болѣзнь, жена его не боялась.

St. praesens. Весь бѣлый, темная окраска находится только: на лицѣ и шеѣ въ отдѣльныхъ мѣстахъ; на груди, въ видѣ маленькихъ пятенъ подъ мышками; далѣе—на ягодицахъ, головкѣ ствола и мошонкѣ, на внутренней поверхности бедеръ и колѣняхъ. Кожа головы бѣлая, а волоса черные, также и на тѣлѣ.

43. Ташъ-Матъ-Мулла-Халь-Матъ-Ахунъ.

3) Ташъ-Матъ-Мулла-Халь-Матъ-Ахунъ, 35 лѣтъ. Маргеланскаго уѣзда. Среди родныхъ больныхъ песью не было. Заболѣлъ 25 лѣтъ тому назадъ. Первое пятно показалось въ лобковой области; въ теченіи 20 лѣтъ почти весь побѣлѣлъ. Женатъ; жена песевая; у нихъ двое дѣтей: старшему 4, 5 лѣтъ, младшему 2 мѣсяца; оба здоровы. Живутъ милостыней.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ лица и отдѣльныхъ мѣстъ шеи. Волосы мѣстами бѣлые, на головѣ съ просѣдью.

44. Макаимъ-Миръ Абдухалыкъ.

4) Макаимъ-Миръ-Абдухалыкъ, 50 лѣтъ. Изъ Коканда, живетъ въ Наманганѣ. Изъ родныхъ болѣлъ песью дядя по отцѣ. Заболѣлъ 12 лѣтъ тому назадъ. Первое пятно вышло на животѣ въ лобковой части. Раньше былъ зудъ на тѣлѣ. Жена тоже песевая; у нихъ 5 человѣкъ дѣтей, старшему 22 года, всѣ здоровы. Живутъ милостыней вмѣстѣ съ 43 и 45.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ темныхъ пятенъ на лицѣ и небольшихъ пятнышекъ на груди. Въ отдѣльныхъ мѣстяхъ рубцы (попытки лѣченія алмазомъ).

45. Чеманъ-Чета-Рузыбай.

5) Чеманъ-Чета-Рузыбай, 43 лѣтъ. Сартъ изъ Маргеланскаго уѣзда, живетъ въ Наманганѣ 6—7 лѣтъ. Жены нѣтъ и не

было. Болѣнъ съ 3-хъ лѣтняго возраста и по разсказамъ родныхъ первое пятно показалось у него на спинѣ. Живетъ милостыней.

St. praesens. Лице и передняя половина волосистой части головы очень темнаго цвѣта. Спина и грудь почти совсѣмъ бѣлыя. Членъ темнаго цвѣта, только у основанія бѣлыя пятна. Темныя пятна симметрически расположены на плечахъ, лучевой поверхности предплечій и кистяхъ рукъ - за исключеніемъ ручныхъ пальцевъ; далѣе, темныя пятна есть на ягодицахъ, бедрахъ и голеняхъ.

46. Халь-Матъ-Бай-Матъ.

6) Халь-Матъ-Бай-Матъ, 52 лѣтъ. Наманганецъ. Болѣнъ 9 лѣтъ. Первое пятно показалось на спинѣ на линіи нижнихъ угловъ лопатокъ; затѣмъ пятно показалось въ правой надключичной области, а чрезъ 2 года въ лѣвой. Женатъ; жена здоровая, ушла отъ него не изъ боязни, а по бѣдности. Живетъ въ своемъ домѣ вмѣстѣ съ 56-ти лѣтней сестрой, занимаются земледѣліемъ: сѣютъ дыни и т. д.

St. praesens. Темныя пятна: на лицѣ, на шеѣ (мелкія, раздѣльныя), въ правой подмышкѣ, на локтяхъ, ягодицахъ, колѣнахъ и на нижней половинѣ голени. Остальное тѣло бѣлое. Волоса черные. На мѣстѣ 1-го пятна рубецъ (отъ лѣченія алмазомъ).

47. Бабаджанъ-Хаджи-Касобъ.

7) Бабаджанъ-Хаджи-Касобъ, 62 лѣтъ. Изъ Коканда. Живетъ въ Наманганѣ 1 мѣсяцъ ради милостыни. Изъ родныхъ песью никто не болѣлъ. Болѣнъ уже 30 лѣтъ. Первое пятно показалось на тылѣ правой стопы, затѣмъ на спинѣ. Женился, когда былъ еще здоровъ (32-хъ лѣтъ), имѣетъ 3-хъ дѣтей: старшей дочери 23 года, сыну—18. Они здоровы.

St. praesens. Нижняя часть лба, щеки, носъ, губы темнаго цвѣта, голова бѣлая и волоса на ней сѣдые, также какъ и усы, и борода. Шея темная съ бѣлыми пятнами. На груди бѣлая окраска занимаетъ: надключичныя пространства, ключицу, подключичныя пространства; затѣмъ, въ видѣ большихъ пятенъ,—середину грудины и боковую часть груди: ниже соска на правой сторонѣ и въ области со-

TAFEL XIX, 1 und 2.

1) Isak-Tscheto-Mamud. (Vitil. № 50). 34 a. n. Ein Onkel väterlicherseits und ein Bruder sind krank Er selbst ist seit 19 Jahren krank.—Der erste Fleck, in der regio deltoidea sinistra. Vor dem Auftreten des Fleckes war Jucken vorhanden.

2) Babadschan-Chadsha. (Vitil. № 47). 62 a. n. Seit 30 Jahren krank. Der erste Fleck auf dem rechten Fussrücken, weiterhin auf dem Rücken. Seine Frau und 3 Kinder (von 23—18 Jahren) sind gesund.

Ferghana—Gebiet. Namangan. 1885.

ска на лѣвой; кромѣ того, въ остающемся темномъ полѣ разсѣяны небольшія бѣлыя пятна. На животѣ спереди верхнія $^2/_3$ окрашены темнымъ цвѣтомъ съ бѣлыми пятнышками, также и mons pubis, съ черными волосами; стволъ, за исключеніемъ темной головки и такой же полосы по серединѣ ствола,—бѣлый; также и мошонка. Спина, поясница и ягодицы бѣлыя; темная окраска въ видѣ полосокъ замѣчается только около подмышечной области и въ верхней части ягодицъ, вдоль crista ilei—въ формѣ маленькихъ пятнышекъ и полосокъ.

Конечности. Темная окраска подмышечныхъ областей, распространяется и на ближайшую окружность плечъ; далѣе, кромѣ темныхъ пятнышекъ въ локтевомъ сгибѣ, ладонная поверхность плечъ предплечій и кистей бѣлая. На тылѣ плечъ темная окраска: на лѣвой сторонѣ доходящая до локтя, на правой—до половины плеча; на тылѣ предплечій таковая же окраска нижней половины праваго предплечія и части кисти, и пятнистая окраска нижней $^1/_3$ лѣваго предплечія; кисти (и пальцы) бѣлаго цвѣта. Въ нижнихъ конечностяхъ: впереди темная окраска (узоръ) въ паховой области; темное пятно въ серединѣ праваго бедра; темная окраска колѣнъ, начинающаяся на лѣвой сторонѣ съ середины бедра. Голени и стопы какъ спереди, такъ и сзади, равно и бедра сзади бѣлаго цвѣта.

48. Юсупъ-Бай-Аширматъ.

8) Юсупъ-Бай-Аширматъ, 74 лѣтъ. Наманганецъ. Изъ родныхъ никто не болѣлъ. Заболѣлъ 13 лѣтъ. Первое пятно появилось на наружной сторонѣ праваго предплечія; пятно на лѣвомъ предплечіи появилось черезъ 2 года послѣ перваго пятна. Женился на здоровой сартянкѣ, она и его 4 сына, прижитыхъ съ нею, здоровы. Живетъ въ своемъ домѣ и работаетъ въ саду.

St. praesens. Весь пестрый, кромѣ темнаго лица и бѣлой совершенно спины.

49. Хайтъ-Вай-Садыкъ-Темирчи.

9) Хайтъ-Вай-Садыкъ-Темирчи, 50 лѣтъ. Наманганецъ. Поденщикъ. Болѣнъ съ 12 лѣтъ. Первое бѣлое пятно появилось на

наружной поверхности праваго бедра; пятно на соотвѣтствующемъ мѣстѣ лѣваго бедра обнаружилось черезъ 3 года; первое пятно не чесалось, а послѣдующія, передъ появленіемъ, зудѣли. Пять лѣтъ какъ распространеніе пятенъ остановилось. Женатъ 14 лѣтъ; жена здорова и имѣетъ отъ него 2 дѣтей: одному 12, другому—9 лѣтъ.

St. praesens. Лице темное; спина бѣлая; остальныя мѣста пестрыя.

50. Исакъ-Чето-Мамутъ.

10) Исакъ-Чето-Мамутъ, 34 лѣтъ. Сартъ Маргеланскаго уѣзда. Нищенствуетъ. Изъ родныхъ болѣлъ песью дядя (по отцѣ) и болѣнъ братъ. Заболѣлъ 15-ти лѣтъ. Первое пятно обнаружилось въ сторонѣ лѣваго deltoideus и мѣсто, передъ появленіемъ пятна, чесалось. Женатъ; жена песевая; 1 ребенокъ; здоровъ. Живетъ съ братомъ у № 41.

St. praesens. Лице очень темное; волоса на головѣ, усахъ и бородѣ черные. Шея темная. Грудь спереди представляетъ темную окраску въ видѣ буквы V; широкія, по краямъ узорчатыя полосы, изображающія эту букву, начинаются подъ мышками и спускаются in regio epigastrica, не достигая пальцевъ 2-хъ до пупка, окрашеннаго темнымъ цвѣтомъ; грудина, надъ и подключичныя пространства и боковыя части груди бѣлыя. Передняя часть живота ниже буквы V бѣлая до mons pubis, окрашеннаго темнымъ цвѣтомъ, съ черными волосами; на стволѣ, около темной головки, бѣлая полоска. Мошонка темная. Сзади темная окраска изображаетъ букву W. Правое и лѣвое колѣно буквы, отдѣленныя другъ отъ друга довольно большими бѣлыми пятнами, помѣщающимися ниже шеи, по обѣимъ сторонамъ позвоночника, начинаются отъ верхняго края надключичной впадины, на правой сторонѣ довольно узкой, на лѣвой—широкой полосой. Нижнія концы буквы достигаютъ поясницы, нѣсколько заворачиваясь къ животу; бѣлая вершина средняго колѣна достигаетъ среднихъ грудныхъ позвонковъ. Поясница бѣлая. На ягодицахъ два симметрическихъ темныхъ большихъ пятна.

Конечности. Въ области deltoidei, спереди, темныя пятна: на правой маленькое, на лѣвой—большое; на правой сторонѣ, въ этой же области сзади—рубецъ (прижиганіе алмазомъ). Въ локте-

выхъ сгибахъ темныя пятнышки; на лѣвой сторонѣ онѣ при помощи темной полоски находятся въ связи съ темнымъ же большимъ пятномъ на наружной поверхности плеча, въ срединѣ его. Тылъ и ладонная поверхность предплечій бѣлые; тылъ кистей, за исключеніемъ пальцевъ, темнаго цвѣта. Нижнія конечности: темныя пятна надъ обѣими колѣнами; голени и тылъ стопъ окрашены темнымъ цвѣтомъ: первыя—спереди, начиная съ середины голеней книзу; сзади—отъ колѣнныхъ ямокъ кое-гдѣ бѣлыя пятна.

51. Маюнусъ-Надыръ-Боква.

11) Маюнусъ-Надыръ-Боква, 63 лѣтъ. Наманганецъ. Родные песью не болѣли. Болѣнъ 2 года (?); первое пятно обнаружилось на ладонной сторонѣ лѣваго предплечія. Женатъ 2 раза, обѣ жены здоровыя; одна умерла, имѣла дѣтей, которые тоже умерли; вторая—бездѣтна. Живетъ въ своемъ домѣ; по ремеслу—мясникъ.

St. praesens. Лице темное; волоса съ просѣдью. Шея тоже темная, также и грудь. На животѣ, надъ самымъ пупкомъ, бѣлая полоса, идущая черезъ весь животъ поперекъ; на правой сторонѣ она шире, спускается нѣсколько внизъ; на лѣвой—уже. На поясницѣ большое бѣлое пятно. Кромѣ того, бѣлыя пятна на верхнихъ конечностяхъ, плечахъ и предплечіяхъ и на бедрахъ вверху и спереди, на правой сторонѣ пятно большое, на лѣвой—маленькое.

ПЕСЕВЫЯ ЖЕНЩИНЫ.

52 (12) Опша-Биби-Мулла-Мадъ-Каимъ, 35 лѣтъ. Изъ Коканда. Пришла въ Наманганъ къ мужу (№ 44). Заболѣла, когда была еще дѣвочкою, а потому не помнитъ, гдѣ явилось первое бѣлое пятно. За Макаима вышла потому, что онъ песевой—другой не взялъ бы ее.

St. praesens. На лицѣ темныя пятна. Тѣло все бѣлое.

53 (13) Хамра-Биби-Савля-Хаджа, 23 лѣтъ. Живетъ въ Наманганѣ, но уроженка Андижанская. Больна 6 лѣтъ. Первое пятно явилось на лбу.

St. praesens. Кромѣ бѣлаго пятна на лбу, большія (по ея словамъ) бѣлыя пятна на спинѣ.

ЧУСТЪ.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

265. Саидъ-Али-Вали-Бай.

Саидъ-Али-Вали-Бай, 20 лѣтъ. Наманганецъ. Женатъ.

Anamnesia. Крайне спутанный.

St. praesens Кромѣ крайне рѣдкихъ волосъ на бровяхъ, рѣсницахъ, усахъ и бородѣ, никакихъ явленій проказы.

18 16/VI 85

ПЕСЕВЫЕ.

---

54. Мирза-Махмудъ-Мулла-Мирза-Аюбъ.

1) Мирза-Махмудъ-Мулла-Мирза-Аюбъ, 47 лѣтъ. Чустецъ. Ткачъ, живетъ въ своемъ домѣ. Болѣлъ песью родной отецъ. Заболѣлъ 21 года. Первое пятно показалось на серединѣ поясницы; но затѣмъ исчезло. Симметрическія пятна показывались не одновременно, а спустя нѣкоторое время, напр. пятно, появившееся на правой рукѣ, обнаружилось на лѣвой только черезъ годъ. Женатъ; женился уже будучи болѣнъ; жена здорова, имѣетъ отъ него 4 дѣтей; изъ нихъ старшему 13, младшему—1 годъ; дѣти здоровы.

St. praesens. Лице темное. Весь пестрый, темная окраска преобладаетъ предъ бѣлой.

55. Чето-Боло-Магометъ-Раджанъ

2) Чето-Боло-Магометъ-Раджанъ, 35 лѣтъ. Чустецъ. Изъ родныхъ болѣли песью двое дядей. Заболѣлъ 15 лѣтъ назадъ.

Первое пятно появилось на лѣвомъ плечѣ. Женатъ; жена песевая (до замужества); 1 ребенокъ 3-хъ лѣтъ, здоровъ.

St praesens. Лицо, кромѣ лба, темное. Симметрическія темныя пятна подъ мышками. На лобкѣ одна половина (лѣвая) бѣлая и волоса сѣдые.

56. Мухамедъ-Шукуръ-Магометъ-Каимъ.

3) Мухамедъ-Шукуръ-Магометъ-Каимъ, 40 лѣтъ. Чустецъ. Ткачъ. Изъ родныхъ никто не болѣлъ. Заболѣлъ 6-ти лѣтъ. Первое пятно явилось на лѣвой сторонѣ груди, подъ ключицею. Позднѣе—сначала пятно появилось на правомъ предплечіи, а на лѣвомъ—черезъ годъ. Распространенію и появленію пятенъ предшествуетъ зудъ. Женатъ; жена здорова, имѣетъ отъ него 2-хъ здоровыхъ дѣтей—15 и 9 лѣтъ

St. praesens. Лицо темное. На тѣлѣ относительно небольшое количество бѣлыхъ пятенъ на буроватой, довольно блѣдной кожѣ.

КОКАНДЪ.

Кокандская махау-хана помѣщается въ предмѣстьи города. Количество больныхъ въ ней не могло быть опредѣлено точно. По указанію самихъ больныхъ, цифра эта не велика; а именно,—немного больше числа осмотрѣнныхъ мною больныхъ: 6 прокаженныхъ (5 мужчинъ и 1 женщина) и 20 песевыхъ (12 мужчинъ и 8 женщинъ). По другимъ указаніямъ ихъ гораздо больше—до 70 и 100 человѣкъ прокаженныхъ и песевыхъ. Я полагаю, что ихъ дѣйствительно больше, чѣмъ указываютъ сами больные; такъ какъ, во 1-хъ, Кокандъ очень большой городъ и прежняя столица Ферганы, во 2-хъ—выѣзжая изъ Коканда, я встрѣтилъ около базара (т. е. за базаромъ) нѣсколько человѣкъ прокаженныхъ, просящихъ милостыню, по преимуществу женщинъ, которыхъ на осмотрѣ у меня не было. Осмотръ больныхъ, произведенный при содѣйствіи д-ровъ Семенова, Биркина и Ротерозена, происходилъ въ саду уѣзднаго начальника Г. С. Ботырева.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

266. Мирза-Раимъ-Турсунъ-Магометъ.

1) Мурза-Раимъ-Турсунъ-Магометъ, 45 лѣтъ. Таджикъ Чустскаго уѣзда. Въ семьѣ были больны еще два брата—старшій и младшій; первый заболѣлъ раньше всѣхъ и умеръ; болѣлъ, судя по указанію Мирзы, кожной формой; второй находится вмѣстѣ съ Мирзой въ пріютѣ. Былъ женатъ 2 раза; съ первою женою развелся, когда заболѣлъ; имѣлъ съ нею, живя 10 лѣтъ, 2-хъ дѣтей; вторая жена—больная проказою—тоже умерла, сношенія съ нею не имѣлъ (импотентъ).

Anamnesis. Считаетъ себя больнымъ 15 лѣтъ. Болѣзнь началась съ блѣднаго, анестетическаго пятна на правой ногѣ; пятно это существовало въ теченіи 5-ти лѣтъ, а потомъ пятна пошли по всему тѣлу.

St. praesens. Кожа лица вялая, съ слѣдами инфильтрата; верхнія вѣки нависли надъ глазами; волосъ на бровяхъ нѣтъ. Помутнѣніе corneae обѣихъ сторонъ и staphyloma лѣваго глаза. Носъ ввалился. Борода и усы рѣдкіе. На мягкомъ небѣ рубцы; uvula отсутсвуетъ; дужки склерозированы. Анестезія лица полная.

Туловище. На шеѣ зобъ умѣренной величины. На спинѣ пятна буроватыя, съ легкимъ инфильтратомъ.

Верхнія конечности. Отдѣльные рубцы. Утолщеніе значительное n. ulnaris, на той и другой сторонѣ. Рѣзкая мышечная атрофія въ кистяхъ, въ особенности—лѣвой; контрактура пальцевъ. Полная анестезія.

Нижнія конечности. На правомъ колѣнѣ рубцы. Кожа голеней и стопъ не утолщена, шелушится. Полная анестезія.

$18\,^{19}/_{VI}\,85$.

267. Мирза-Сафаръ-Турсунъ-Матъ.

2) Мирза-Сафаръ-Турсунъ-Матъ, 34 лѣтъ. Таджикъ, Чустскаго уѣзда. Въ семьѣ болѣли проказою 2 старшихъ брата

TAFEL XX.

Mirsa Raim. (№ 266). 45 a. n.

Anamnesis. Sein älterer Bruder war krank und ist bereits gestorben, sein jüngerer Bruder ist noch zur Zeit krank (cf. Taf. XXI). Berechnet die Dauer seiner Erkrankung auf 15 Jahre. Beginn: blasser, anaesthetischer Fleck auf dem rechten Fuss, welcher 5 Jahre allein bestand; daraufhin verbreiteten sich die Flecke über den ganzen Körper.

Stat. praes. Fast vollständig resorbirte Infiltrate des Gesichts. Auf den unteren und oberen Extremitäten zahlreiche Narben. Muskelatrophieen und Contracturen der Finger; reichliche Desquamation der infiltrirten Haut der Unterschenkel und Füsse. Allgemeine Anaesthesie. Endemischer Kropf.

Ferghana—Gebiet. Kokhand. 1885.

TAFEL XXI.

Mirza-Safar (№ 267). 34 a. n. Verheirathet mit einer Vitiligo—Kranken. 3 gesunde Kinder.

Anamnesis. Cf. den Fall Taf. XX. Seit 12 Jahren krank. Beginn: Blasen auf dem linken Knie.

Stat. praes. Typische primäre Nervenlepra. An den unteren Extremitäten pemphiginöse Geschwüre und Narben. Verdickung der Epiphysen der Tibia und Fibula im rechten Sprunggelenk. Atrophie der Muskeln der Unterschenkel. Mutilation der linken grossen Zehe; Verdickung der Haut an den übrigen Zehen. Allgemeine, vollständige Anästhesie.

Kokhand. 1885.

(см. выше). Мирза женатъ 8 лѣтъ; жена, песевая, прижила съ нимъ 3-хъ дѣтей: старшему 6 лѣтъ, младшему 3; всѣ трое здоровы.

Anamnesis. Болѣнъ 12 лѣтъ. Началась болѣзнь пузыремъ на лѣвомъ колѣнѣ.

St. praesens. Лице типическаго анестетика: брови густыя; глаза широко раскрыты; нижнія вѣки отвисли и не поднимаются; на краяхъ ихъ слезы; все лицо нѣсколько скошено на право; усы густые, борода жидкая; въ полости рта никакихъ измѣненій. Анестезія, выраженная рѣзче на лѣвой сторонѣ.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцовъ нѣтъ. Въ кистяхъ рѣзкая мышечная атрофія и мутиляціи, контрактуры и язвы. На правой сторонѣ: большой палецъ нѣсколько согнутъ; у основанія 1-й его фаланги, на ладонной сторонѣ, сухая омозолѣлая язва, величиною въ пятакъ; у 2-го, 3-го и 4-го пальцевъ недостаетъ 2-хъ послѣднихъ фалангъ; мизинецъ цѣлъ, но представляетъ очень сильную контрактуру; кромѣ того, на ульнарной сторонѣ ладони нѣсколько язвъ, въ формѣ мозолистыхъ трещинъ. На лѣвой сторонѣ мутиляцій нѣтъ, но значительная контрактура всѣхъ пальцевъ, и, въ отдѣльныхъ мѣстахъ, мозолистыя трещины. Анестезія полная.

Нижнія конечности. Рубцы на колѣняхъ и язва на лѣвомъ колѣнѣ, покрытая сухимъ струпомъ. На правой сторонѣ: утолщеніе сочленовыхъ концевъ tibiae et fibulae; атрофія мышцъ голеней; утолщеніе концевъ пальцевъ, какъ кожи, такъ и костей. На лѣвой сторонѣ: голенно-стопное сочлененіе не утолщено; мутиляція большаго пальца и значительное утолщеніе кожи 2-го пальца. Анестезія полная.

$18\,^{19}/_{VI}\,85$

268. Сарбай-Хаджанкуловъ.

3) Сарбай-Хаджанкуловъ, 36 лѣтъ. Узбекъ Кураминскаго уѣзда. Отецъ, мать, 38-ми лѣтній братъ и 20-ти лѣтняя сестра здоровы; была ли болѣзнь между другими родными—не знаетъ. Женился въ махау-ханѣ на прокаженной же (№ 6); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis Болѣнъ, какъ говорили ему родители, 31 годъ;

еще въ раннемъ дѣтствѣ начали отваливаться пальцы. Усы и борода начали рости только теперь.

St. praesens. Типическій анестетикъ: ectropion нижнихъ вѣкъ; лице скошено на право; волосы бровей густые, въ усахъ и бородѣ они, какъ у 18-ти лѣтняго юноши, какъ бы только пробиваются; въ полости рта никакихъ измѣненій, но голосъ сиплый (отчего?).

Туловище. Пятенъ нѣтъ.

Верхнія конечности. Рубцы на предплечіяхъ и локтяхъ. Мутиляція кистей, изображенная отчетливо на рисункѣ (2-й отдѣлъ). Анестезія, но не рѣзкая и безпорядочная.

Нижнія конечности. На лѣвомъ колѣнѣ рубцы, на правомъ нѣтъ. Концы 2-го и 3-го пальцевъ лѣвой ноги значительно утолщены и на подошвенной поверхности 2-го пальца глубокая язва, въ формѣ трещины Анестезія не рѣзкая. Пателлярный рефлексъ отсутствуетъ. Половая дѣятельность нормальна.

$18^{19}/_{VI}85$

269. Дюша-Кальду.

4) Дюша-Кальду, 23 лѣтъ. Кураминскаго уѣзда. Холостъ. Родные не болѣли.

Anamnesis. Болѣнъ 6 лѣтъ. Прежде всего обнаружился пузырь на мыщелкахъ правой стопы; черезъ 2 года стало пухнуть лице и выпадать брови.

St. praesens. Лице опухшее темное; инфильтратъ вездѣ равномѣрный, кромѣ щекъ, гдѣ ощущается узловатость. Полное отсутствіе волосъ на бровяхъ, въ усахъ и бородѣ.

Туловище. Кожа спины и груди темнаго, свинцоваго цвѣта. Соски выдаются, инфильтрованы.

Верхнія конечности. Равномѣрный инфильтратъ тыла плечъ; рубцы на ульнарной сторонѣ лѣваго предплечія. Атрофія, хотя и слабо выраженная, мышцъ кистей. Анестезія безпорядочная.

Нижнія конечности. Равномѣрный и не рѣзко выраженный инфильтратъ кожи бедеръ и голеней.

$18^{19}/_{VI}85$

TAFEL XXII.

Sarabai-Chodshankul (№ 268). 36 a. n.

Anamnesis. Er ist, wie ihm seine Eltern mitgetheilt haben, seit 31 Jahren krank. Bereits in frühester Jugend fingen seine Finger an abzufallen. Seine Barthaare sind jetzt erst zum Vorschein gekommen.

Stat. praes. Typische primäre Nervenlepra. Narben auf den Extremitäten. Verdickung der Spitzen der 2 und 3 Zehe des linken Fusses und ein perforirendes Geschwür an der Plantarfläche der zweiten Zehe. Die Anaesthesie ist nicht deutlich ausgesprochen und ohne regelmässige Anordnung.

Kokhand. 1885.

270. Иркабай.

5) Иркабай, 34 лѣтъ, узбекъ Чустскаго уѣзда. Родные не болѣли. Женатъ на песевой.

Anamnesis. Болѣнъ 10 лѣтъ. Болѣзнь началась пузыремъ на лѣвой подошвѣ.

St. praesens. На лицѣ слѣды всосавшихся инфильтратовъ.

Туловище. Пятна бураго цвѣта на спинѣ: одно длинное, тянется въ видѣ широкой полосы вдоль спины, нѣсколько ниже шеи до поясницы; два другія симметричны, величиною больше пятака, на лопаткѣ. Чувствительность въ сторонѣ пятенъ ослаблена.

Верхнія конечности. На правомъ локтѣ рубцы, на лѣвомъ—сухая, каллёзная язва; другихъ измѣненій нѣтъ. Анестезія безпорядочная.

Нижнія конечности. Рубцы на голени (бывшіе пузыри и язвы); инфильтратовъ нѣтъ. Анестезія безпорядочная. Отсутствіе сухожильныхъ рефлексовъ.

$18^{19}/_{VI}85$

271. Сара-Маркулъ.

Сара-Маркулъ, 24 лѣтъ, Чустскаго уѣзда. Родные не болѣли. Замужемъ въ Махау-Ханѣ за № 3; съ первымъ мужемъ, съ которымъ позднѣе развелась, жила 3 года и имѣла 1-го ребенка.

Anamnesis. Больна съ дѣтства. Болѣзнь началась тѣмъ, что она распухла и посинѣла, у нея стали вылѣзать брови; позднѣе опухоль исчезла. Крови правильны.

St. praesens. Лице типическаго анестетика, но съ довольно рѣдкими бровями. Морщины на правой сторонѣ выражены рѣзче. Анестезій нѣтъ.

Конечности. Рубцы и анестезіи. Колѣнный рефлексъ отсутствуетъ.

$18^{19}/_{VI}85$

ПЕСЕВЫЕ.

---

57. Керимъ-Джанъ-Уста-Ходай-Назаръ.

1) Керимъ-Джанъ-Уста-Ходай-Назаръ, 33 лѣтъ. Таджикъ. Кокандскаго уѣзда. Родные не болѣли. Болѣнъ 15 лѣтъ.

Первое бѣлое пятно показалось подъ правымъ ухомъ. Женатъ на песевой; у нихъ одна дѣвочка.

St. praesens. Середина лба и нижняя половина его, а также лице до ушей темныя. Волоса на головѣ, кромѣ отдѣльныхъ, небольшихъ бѣлыхъ мѣстъ, черные. Шея, все туловище и конечности бѣлыя, за исключеніемъ маленькихъ темныхъ пятнышекъ на выѣ.

$18^{20}/_{VI}85$

58. Мараимъ-Абраимовъ.

2) Мараимъ-Абраимовъ, 33 лѣтъ. Узбекъ Кураминскаго уѣзда. Отецъ, мать, 5 братьевъ и одна сестра здоровы. Болѣнъ 16 лѣтъ. Первое пятно, въ 20-ти коп. монету, явилось на поясницѣ. Женатъ 7 лѣтъ на песевой, имѣетъ 2-хъ дѣтей: сына 4-хъ лѣтъ и дочь 6-ти мѣсяцевъ.

St. praesens. Верхняя половина лба и вся волосистая часть головы бѣлыя, волоса сѣдые; лице до ушей темное. Шея сзади темная, спереди—бѣлая, съ темными пятнышками. На груди темныя пятнышки находятся только въ области manubrii и въ ближайшей его окружности. Остальное тѣло, также какъ и конечности, бѣлаго цвѣта, за исключеніемъ темныхъ пятнышекъ въ области колѣнъ спереди.

59. Мулла-Баба-Шаримъ-Бай.

3) Мулла-Баба-Шаримъ-Бай, 45 лѣтъ. Узбекъ Наманганскаго уѣзда. Болѣнъ съ малолѣтства, въ махау-ханѣ 15 лѣтъ. Первое пятно, какъ говорятъ родные, замѣтили на поясницѣ. Женатъ; жена здоровая; имѣетъ съ нею 1-го ребенка.

St praesens. Лице, начиная съ бровей, темное; волосистая часть головы и волоса бѣлые. На шеѣ, сзади, темная окраска; спереди шея бѣлая, также какъ и все туловище и конечности.

60. Турды-Бай-Али-Бай.

4) Турды-Бай Али-Бай, 38 лѣтъ. Узбекъ Наманганскаго уѣзда. Болѣнъ 25 лѣтъ; въ махау-ханѣ 12 лѣтъ. Первое пятно по-

казалось на поясницѣ. Былъ женатъ, но жена умерла; дѣтей не было.

St. praesens. Темныя пятна на щекахъ и таковая же окраска носа. Волоса черные, за исключеніемъ бѣлой, сѣдой полосы, начинающейся съ темянныхъ бугровъ и захватывающей затылокъ. Остальное тѣло и конечности бѣлыя.

61. Урусъ-Бай-Турды-Бай.

5) Урусъ- Бай-Турды-Бай, 49 лѣтъ. Кокандскій узбекъ. Болѣнъ 16 лѣтъ, въ махау-ханѣ 10 лѣтъ. Первое пятно явилось на лѣвой боковой части груди. Женатъ 4 года на песевой; было двое дѣтей,—оба умерли.

St. praesens. Темная окраска носа и темныя пятна на щекахъ; остальное тѣло и конечности бѣлыя

62. Халь-Мурза-Магометъ-Хаджа.

6) Халь-Мурза-Магометъ-Хаджа, 28 лѣтъ. Наманганскій узбекъ. Семья здорова. Болѣнъ 15 лѣтъ. Первое пятно показалось у внутренняго угла праваго глаза. Въ Махау-ханѣ 6 лѣтъ. Женатъ 5 лѣтъ на песевой.

St. praesens. Лице, кромѣ бѣлыхъ пятнышекъ на лбу, около самыхъ волосъ темное, также, какъ и волосистая часть головы и шея. Надъ и подключичныя пространства бѣлыя, съ темными пятнами на внутренней половинѣ ключицъ. Отъ указанныхъ сейчасъ пространствъ бѣлая окраска распространяется въ видѣ полосы на грудину и кончается нѣсколько ниже уровня сосковъ. Остальная передняя часть груди—помимо небольшихъ бѣлыхъ пятенъ, изъ которыхъ 2 симметрически расположены около сосковъ,—окрашена темнымъ цвѣтомъ. Боковыя части груди и спины бѣлаго цвѣта, за исключеніемъ темныхъ пятенъ, находящихся въ 2-хъ мѣстахъ: въ одномъ темная полоса, на той и другой сторонѣ, тянется отъ мышекъ, окрашенныхъ темнымъ цвѣтомъ, вдоль spinae scapulae; другое мѣсто соотвѣтствуетъ областямъ почекъ, гдѣ находятся довольно большія темныя пятна.

Конечности. Верхнія: бѣлыя пятна на передней поверхности плечъ и ладонной предплечій; на послѣдней пятна небольшія и рѣд-

кія; на задней поверхности плечъ небольшія бѣлыя пятна; далѣе, бѣлая окраска находится въ локтевой области сзади, причемъ на лѣвой сторонѣ она спускается на тылъ предплечія до кистей, на правой—на тылѣ же—находятся только небольшія пятна, и таковыя же—на тылѣ кистей. Въ нижнихъ конечностяхъ бѣлыя пятна находятся только на передней поверхности голени и на тылѣ стопы.

63. Юлдашъ-Бай-Риза-Матъ

7) Юлдашъ-Бай-Риза-Матъ, 37 лѣтъ. Узбекъ Андижанскаго уѣзда. Родные не болѣли. Болѣнъ 20 лѣтъ. Первое пятно показалось на правомъ бедрѣ. Женатъ 6 мѣсяцевъ на песевой.

St. praesens. Лице темное; волосистая часть головы, за исключеніемъ затылочной области, бѣлая и вмѣстѣ съ тѣмъ сѣдая. Шея темная. Наружная половина надъ и подключичныхъ пространствъ бѣлаго цвѣта. На груди спереди бѣлыя пятна: одно большое, начинается въ серединѣ грудины и спускается внизъ; причемъ расширяясь, доходитъ до epigastrium; другое пятно величиною около ладони помѣщается между верхнимъ концемъ 1-го пятна и лѣвой ключицей; на другой сторонѣ ему соотвѣтствуетъ только небольшое бѣлое пятнышко. На спинѣ бѣлая окраска въ видѣ широкой полосы, распространяющейся на плечи (mm. deltoidei), занимаетъ верхнюю часть спины, начинаясь тотчасъ ниже шеи; кромѣ того, существуютъ бѣлыя пятна, въ видѣ довольно широкой полосы, на поясницѣ, по линіи позвонковъ.

Конечности. Верхнія: спереди плечи и предплечія бѣлаго цвѣта, за исключеніемъ мышекъ и локтеваго сгиба, а также отдѣльныхъ пятнышекъ на предплечіяхъ. Сзади кожа темнаго цвѣта, съ небольшими бѣлыми пятнами. На нижнихъ конечностяхъ бѣлыя пятна, довольно крупныя, находятся на передней поверхности голеней и стопъ, сзади же только въ области ахиллесова сухожилья.

64. Хайдаръ-Бай-Шаримъ-Бай

8) Хайдаръ-Бай-Шаримъ-Бай, 54 лѣтъ. Самаркандскій узбекъ. Болѣнъ 28 лѣтъ; въ Махау-Ханѣ 16 лѣтъ. Первое пятно об-

наружилось на животѣ, на право отъ пупка. Женатъ 10 лѣтъ на песевой, имѣетъ 2-хъ дѣтей: 5-ти и 4-хъ лѣтъ; дѣти здоровы.

St. praesens. Бѣлыя пятна находятся только въ слѣдующихъ мѣстахъ: на животѣ, на право отъ пупка бѣлое пятно въ гривенникъ величиною; на спинѣ, въ верхней части поясничной области, на лѣвой сторонѣ нѣсколько пятенъ; изъ нихъ только одно большое, около яйца, трехугольной формы; остальныя маленькія; на правой лопаткѣ, подъ лопаточной костью пятно, величиною въ миндалину. Остальныя части тѣла—лице, туловище и конечности—окрашены темнымъ цвѣтомъ.

65. Халь-Мамедъ-Уста-Фазы.

9) Халь-Мамедъ-Уста-Фазы, 30 лѣтъ. Родные здоровы. Первое пятно показалось еще у ребенка на правомъ вискѣ; въ махау-ханѣ около года. Холостъ.

St. praesens. Бѣлыя пятна находятся только на головѣ, а именно: въ сторонѣ праваго виска, откуда бѣлая окраска распространяется на волосистую часть головы и захватываетъ всю височную область до затылка; кромѣ того, бѣлыя пятна находятся на правой же сторонѣ въ темянной и затылочной областяхъ по серединѣ. Волоса въ срединѣ пятенъ сѣдые. Наконецъ, небольшое бѣлое пятно находится на правой сторонѣ верхней губы, около носо-губной складки. Остальное тѣло темное.

66. Урусъ-Бай-Иса-Бай.

10) Урусъ-Бай-Иса-Бай, 43 лѣтъ. Кокандскій узбекъ. Болѣнъ болѣе 20-ти лѣтъ; въ Махау-Ханѣ 16 лѣтъ. Первое пятно явилось на затылкѣ, а спустя два года—на поясницѣ. Женатъ на песевой; двое сыновей отъ нихъ здоровы.

St. praesens. Бѣлыя пятна находятся: на затылкѣ, около лѣваго processus mastoideus и на поясницѣ, надъ крестцомъ; кромѣ того, лѣвый усъ сѣдой. Остальное тѣло темное.

67. Маулянъ-Бай-Оскаръ-Бай.

11) Маулянъ-Бай-Оскаръ-Бай, 29 лѣтъ. Родные здоровы. Болѣнъ 13 лѣтъ. Пятно появилось на поясницѣ. Женатъ на здоровой; имѣетъ 3-хъ здоровыхъ дѣтей.

St. praesens. Бѣлое пятно въ мѣдный пятакъ на поясницѣ.

68. Мирза-Ахмедъ-Мирза-Саудатъ.

12) Мирза-Ахмедъ-Мирза-Саудатъ, 55 лѣтъ. Чустскій узбекъ. Болѣнъ 15 лѣтъ. Первое пятно появилось на поясницѣ. Женатъ на песевой. Дѣтей нѣтъ.

St. praesens. Мелко-пятнистая форма, въ родѣ Борза-Махмуда (Таб. XV, рис. 19) въ Андижанѣ.

Песевыя женщины въ Кокандѣ:

69 (13) Софія Мимахаджа,50 лѣтъ. Изъ Коканда. Больна 16 лѣтъ. Первое пятно на локтѣ правой руки; 3 года замужемъ въ махау-ханѣ; имѣла 2-хъ дѣтей; оба умерли.

70 (14) Хамра-Маширимъ, 13 лѣтъ. Изъ Намангана. Больна 5 лѣтъ. Первое пятно на шеѣ. Замужемъ и въ махау-ханѣ 6 мѣсяцевъ.

71 (15) Хальма, 18 лѣтъ. Кокандская сартянка. Больна 5 лѣтъ. Первое пятно на шеѣ. Замужемъ за Мараимомъ (58).

72 (16) Роза-Биби, 23 лѣтъ. Маргеланскаго уѣзда. Родные не болѣли. Больна 15 лѣтъ. Первое пятно явилось на спинѣ, на лѣвой сторонѣ. Замужемъ за Керимъ-Джаномъ (57).

St. praesens. Красивое лицо, вся бѣлая.

73 (17) Марзія, 22-хъ лѣтъ. Изъ Хаджента. Таджичка. Больна 8 лѣтъ. Первое пятно на спинѣ; замужемъ за Урусъ-Баемъ (61).

[illegible]aesens. Кромѣ лица и темныхъ пятенъ на тылѣ кистей вся бѣлая.

74 (18) Фатьма, 27 лѣтъ. Кокандская Таджичка. Больна 20 лѣтъ. Гдѣ появилось первое пятно не знаетъ. Замужемъ за прокаженнымъ Мирза-Сафаромъ (№ 267).

St. praesens. Кромѣ лица вся бѣлая.

TAFEL XXIII.

Mirza Achmet (Vitil. № 68). 55 a. n. Seit 15 Jahren krank; der erste Fleck an der Lenden-Gegend; auch die Frau ist eine Vitiligo—Kranke.

Stat. praes. Kleinfleckige Vitiligo. Die dunkelen Punkte entsprechen den Haarwurzeln.

Kokhand. 1885.

75 (19) Майрамъ, 24 лѣтъ. Изъ Андижанскаго уѣзда. Больна лѣтъ 10. Первое пятно явилось на поясницѣ. Замужемъ за Халь-Мурзой (62); имѣетъ 2-хъ здоровыхъ дѣтей.

St. praesens. Пятна только на поясницѣ.

76 (20) Тиля-Биби, 16 лѣтъ. Кокандская узбечка. Больна 4 года. Первое пятно на поясницѣ. Замужемъ за прокаженнымъ Иркабаемъ (№ 27) всего 2 мѣсяца.

УРА-ТЮБЕ.

Кишлакъ Махау въ Ура Тюбе находится за городомъ, въ разстояніи отъ него версты въ 4. Въ Кишлакѣ этомъ помѣщаются спеціально прокаженные, въ количествѣ 26 человѣкъ (16 мужчинъ и 10 женщинъ). Осмотръ производился мною и д-ромъ Бентковскимъ въ Ура-Тюбинскомъ военномъ лазаретѣ, находящемся въ завѣдываніи д-ра Тишкова, при очень любезномъ содѣйствіи послѣдняго.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

272. Берды-Гайдыбаевъ.

1) Берды-Гайдыбаевъ, 37 лѣтъ. Узбекъ Ходжентскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣлъ проказою двоюродный братъ, заболѣвшій впрочемъ позднѣе Берды, но уже умершій въ Махау-Ханѣ. Берды былъ женатъ 4 раза на здоровыхъ женахъ, но дѣтей отъ нихъ не имѣлъ. Всѣ жены померли.

Anamnesis. Болѣзнь началась краснымъ, зудящимъ пузыремъ, какъ отъ ожоги, на наружной поверхности бедра, около мыщелка.

St. praesens. Лице блѣдное, худое, нѣсколько скошено на лѣво; кожа вялая, отвислая, съ обильными складками. Волосъ въ бровяхъ, а также усовъ и бороды нѣтъ и слѣда. Ectropion нижнихъ вѣкъ, въ особенности праваго. Носъ въ серединѣ ввалился; конецъ его и крылья приплюснуты. На мягкомъ нёбѣ, около uvulae трехъугольный рубецъ, притянувшій uvulam вверхъ и впередъ.

Туловище. Пятенъ нѣтъ. Отверстіе urethrae съужено, но узловъ и инфильтрата нѣтъ.

Верхнія конечности. На плечахъ обильные, бѣлые рубцовые слѣды pemphigus. Таковые же на обоихъ локтяхъ и предплечіяхъ; на ладонной поверхности праваго предплечія большой, неправильный, рѣзко ограниченный рубецъ. Мышцы кистей сильно атрофированы. Мутиляцій нѣтъ. Контрактуры: на правой сторонѣ слабыя (въ 4-мъ и 5-мъ пальцахъ они рѣзче); на лѣвой сторонѣ на столько сильныя, что ладонныя поверхности двухъ послѣднихъ фалангъ соприкасаются съ ладонною поверхностью 1-ой и ладонью; большой палецъ искривленъ подъ прямымъ угломъ.

Нижнія конечности. На ягодицахъ и голеняхъ обильные рубцы. Кожа стопъ утолщена, инфильтрована. На правой сторонѣ пальцы утолщены и искривлены внутрь; На лѣвой стопѣ мутиляціи: дефектъ послѣдней фаланги hallucis и почти полное отсутствіе 2-го пальца и мизинца. Обильные рубцы на обѣихъ стопахъ.

Общая и полная анестезія.

$18\,^{25}/_{VI}\,85$

273. Хаитъ-Бай-Сеитъ-Умаровъ.

2) Хаитъ-Бай-Сеитъ-Умаровъ, 19 лѣтъ (?). Уроженецъ Ходжента. Изъ родныхъ болѣлъ проказою племянникъ, умершій 16 лѣтъ тому назадъ.

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ (?); въ кишлакѣ-махау 6 лѣтъ.

St. praesens. Видъ 10-ти лѣтняго мальчика. Типическій анестетикъ: брови густыя; лицо нѣсколько скошено на лѣво; глазъ закрыть не можетъ (нижнее вѣко), также какъ и надуть щекъ; фибриллярныя сокращенія мышцъ; отсутствіе измѣненій въ полости рта.

Туловище. Ничего особеннаго; кой-гдѣ рубцы. Penis и testes атрофичны.

Верхнія конечности. Сильная атрофія мышцъ плечъ, предплечій и въ особенности кистей рукъ. Рубцы на тѣхъ же частяхъ и локтяхъ. На ладонной поверхности сочлененія кисти находится глубокая, сухая, покрытая растрескавшимся тонкимъ струпомъ язва, величиною въ миндалину; изъ трещинъ на днѣ сочится прозрачная

TAFEL XXIV.

Berdi Gaidibajeff. (№ 273). 37 a. n.

Anamnesis. Ein Vetter von ihm war krank; ist todt. Beginn: Pemphigus am Oberschenkel.

Stat. praes. Typische secundäre Nervenform (keine Spur mehr von Infiltraten oder Knoten). Atrophie der Haut. Zahlreiche Narben. Verdickung und Sklerose der Haut an den Füssen. Verunstaltung der Zehen des rechten, und Mutilationen an jenen des linken Fusses. Allgemeine, vollständige Anaesthesie.

Sir-Darja Gebiet, Ura-Tjube. 1885.

TAFEL XXV Fig. 1 und 2.

Fig. 1. Chait Bey (№ 273). 19 a. n.

Anamnesis. Ein Neffe von ihm war krank, ist vor 16 Jahren gestorben.

Stat. praes. Hat das Aeussere eines 10 jährigen Knaben. Typische primäre Nervenlepra. Fibrilläre Zuckungen der Gesichtsmuskeln. Zahlreiche Narben an den Extremitäten. Mutilationen an den Zehen beider Füsse. Allgemeine, complete Anaesthesie.

Fig. 2. Mahmet Jussuf. (№ 274). 30 a. n.

Anamnesis. Von den Verwandten waren krank: ein Onkel, zwei Neffen und eine Nichte; sämmtlich gestorben. Er selbst ist seit 19 Jahren krank. In der Ansiedelung befindet er sich seit 7 Jahren. Beginn: Pemphigus auf der rechten Gesässbacke (schon damals wusste er, dass er an Lepra erkrankt sei). 8 Jahre hindurch manifestirte sich die Krankheit durch Nichts, schliesslich traten jedoch Blasen auf den Knieen und Schwellung des Gesichts auf.

Stat. praes. Regressive Periode. Infiltrate und Knoten sind fast vollständig resorbirt. Leichte Muskelatrophie an den Händen. Tiefliegende Knoten in der Gegend der Tendines Achillis an beiden Füssen. Zahlreiche Narben. Universelle, complete Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

серозная жидкость Кожа ладоней суха, шелушится. Въ пальцахъ довольно сильная контрактура. Послѣдняя фаланга мизинца укорочена, и соотвѣтственно этому, кожа на ладонной поверхности выдается въ видѣ бугра. Анестезія полная.

Нижнія конечности. Бедренныя и паховыя желѣзы значительно увеличены въ объемѣ. На колѣнахъ и голеняхъ обильные рубцы. На правой стопѣ полный дефектъ большаго пальца и половины втораго; на подошвѣ язвы въ видѣ глубокихъ трещинъ. На лѣвой стопѣ: язвы на свободныхъ концахъ 2-го и 3-го пальцевъ. Анестезія полная.

274. Махмедъ-Юсуфъ-Мирза- Ахмедовъ.

3) Махмедъ-Юсуфъ-Мирза-Ахмедовъ, 30 лѣтъ. Ходжентскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣли проказою четверо: два племянника, одна племянница и дядя. Всѣ умерли въ здѣшней махауханѣ. Махметъ женился въ пріютѣ (жена его Ракія № 291); дѣтей нѣтъ—онъ импотентъ.

Anamnesis. Болѣнъ 19 лѣтъ. Въ пріютѣ 7 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась краснымъ пузыремъ, въ видѣ ожоги, на правой ягодицѣ и ляжкѣ; уже тогда онъ зналъ, что заболѣлъ проказою, такъ какъ на родинѣ были такіе же больные. 8 лѣтъ болѣзнь не обнаруживалась, потомъ явился пузырь на колѣнкѣ и стало пухнуть лице.

St. praesens. Лице довольно худое и не очень темное. Кожа вообще довольно мягка, вяла (всосавшійся инфильтратъ); только въ правой брови прощупывается бляшка, а на лѣвой—узелъ, но и тотъ и другая довольно мягкіе. Волосъ на бровяхъ нѣтъ; усы и борода очень рѣдкіе. Staphyloma лѣваго глаза. Носъ ввалился. На мягкомъ нёбѣ твердый узелъ; uvula уничтожена; на ея мѣстѣ рубецъ. На кончикѣ языка бѣлое сосочковое пятно, соотвѣтствующее глубокому узелку.

Туловище. Пятенъ на груди и спинѣ нѣтъ. Corona glandis выдается въ видѣ рѣзкаго узловатаго валика; придатки значительно утолщены.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцы. Въ кистяхъ легкая степень мышечной атрофіи и кожа шелушится. Анестезія.

Нижнія конечности. Въ сторонѣ праваго trochanter обширный рубецъ цвѣта кожи. На правомъ колѣнѣ много, на лѣвомъ—одинъ рубецъ. Въ срединѣ ахиллова сухожилья той и другой стороны глубокіе узлы. Концы 2-го и 3-го пальцевъ утолщены. Пателлярный рефлексъ слабъ. Анестезія полная.

275. Шатансуровъ-Шакасимовъ.

4) Шатансуровъ-Шакасимовъ, 35 лѣтъ. Ходжентскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣлъ племянникъ, котораго онъ однако не видалъ и сестра отца, умершая уже давно; онъ ея не помнитъ. Шатансуровъ былъ женатъ въ пріютѣ 2 раза, оба раза на прокаженныхъ; послѣдняя жена жива (Хамра Магометъ, № 291).

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ (въ пріютѣ только 3 года). Болѣзнь обнаружилась краснымъ пузыремъ вродѣ ожоги на лѣвой ногѣ, на наружномъ мыщелкѣ; изъ развившейся позднѣе на этомъ мѣстѣ язвы выходили косточки; такіе же пузыри и язвы чрезъ годъ показались на правой ногѣ, на внутреннемъ мыщелкѣ.

St. praesens. Лице опухшее, красноватое, гладкое, за исключеніемъ бровей, гдѣ замѣчаются бугры,—причемъ кожа бровей и частью лба представляетъ узловатый инфильтратъ. Кожа шеи и носа, а также и губъ инфильтрованы; инфильтратъ довольно мягкій, въ щекахъ слегка узловатый Борода густая, но усы въ серединѣ очень рѣдки. На мягкомъ нёбѣ трехугольная площадка занятая узлами, а между ними язвочками.

Туловище. На груди, животѣ и спинѣ разсѣяны буроватыя пятнышки (пигментація). На правой сторонѣ glandis узелъ, величиною въ чечевицу, съ центральнымъ углубленіемъ.

Верхнія конечности. Кожа предплечій инфильтрована; инфильтратъ мягкій, въ немъ прощупываются по тракту венъ узловатыя четки, на правой сторонѣ болѣе обильныя и ясныя, чѣмъ на лѣвой. Анестезія полная.

Нижнія конечности. На колѣнахъ рубцы. Кожа голеней утолщена и склерозирована. Около внутренняго мыщелка правой и наружнаго лѣвой ноги—язвы, съ краснымъ гладкимъ дномъ и склерозированными, цикатризующимися краями; правая язва овальной фор-

TAFEL XXVI, Fig. 1 und 2.

Fig. 1. Schatanssuroff (№ 275). 35 a. n.

Anamnesis. Seit 9 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 3 Jahren. Beginn: rothe Blasen (Pemphigus) auf dem äusseren Knöchel des linken Fusses; nach einem Jahre eine ebensolche Blase auf dem inneren Knöchel des rechten Fusses.

Stat. praes. Gesicht geschwollen, geröthet, glatt. Die Infiltrate leicht knotig; weiches Infiltrat der Haut des Vorderarms; paternosterförmige Knoten an den Venen. Narben, Geschwüre und Mutilationen am Fuss (Defect eines Theiles des 5-ten Metatarsal—Knochens des linken Fusses). Vollständige, allgemeine Anaesthesie.

Fig. 2. Kuldasch Juldascheff (№ 277). 66 a. n

Anamnesis. Sein Sohn, der vor ihm erkrankte, ist leprös (Siehe Taf. XXVIII). Beginn: Pemphigus.

Stat. praes. Gleichmässiges Infiltrat (progressive Periode) des Gesichts. Verdickung der Zehen. Allgemeine Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

TAFEL XXVII

Bey Mahomet (№ 276). 37 a. n.

Anamnesis. Seit 19 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 11 Jahren.

Stat. praes. Primäre Nervenlepra. Mutilationen an den Fingern und ein perforirendes Ulcus an der linken Fusssohle. Vollständige Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

мы 5 цент. длины и 3 ширины; лѣвая—круглая, величиною въ 20 коп. На тылѣ правой стопы язва, покрытая струпомъ, величиною въ гривенникъ. Мутиляціи въ лѣвой стопѣ: дефектъ части плюсневой 5-ой кости, причемъ мизинецъ, кости котораго цѣлы, отодвинутъ назадъ. Анестезія полная.

276. Бай-Мухаметъ-Ай-Мухаметовъ.

5) Бай-Мухаметъ-Ай-Мухаметовъ, 37 лѣтъ. Уроженецъ Джизакскій. Женатъ въ пріютѣ на прокаженной (Гульджанъ № 290). Родственниковъ больныхъ не знаетъ.

Anamnesis. Болѣнъ 19 лѣтъ; въ пріютѣ 11 лѣтъ.

St. praesens. Лице типическаго анестетика, скошенное на лѣвую сторону; глаза не закрываются—ectropion нижнихъ вѣкъ, съ которыхъ не сходятъ слёзы; брови, усы и борода густые; въ полости рта никакихъ измѣненій.

Туловище. Пятенъ на груди и спинѣ нѣтъ. Анестезія. Правый придатокъ узловатъ.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцы. Мышцы кистей рукъ значительно атрофированы, на нихъ рубцы, язвы и контрактуры, и мутиляція пальцевъ. На правой сторонѣ: отсутствіе послѣдней фаланги большаго пальца; 2-й и 3-й указательнаго; 3-й и частью 2-й—3 и 4 пальцевъ и части 3-й фаланги мизинца; на ладони ближе къ сочлененію кисти сухая язва въ гривну величиною, съ шелушащимися, склерозированными краями. На лѣвой сторонѣ: дефектъ послѣдней фаланги большаго пальца; 3-й и частью 2-й указательнаго; 3-й же фаланги 3-го пальца; кожа послѣднихъ, нѣсколько укороченныхъ фалангъ 4-го и 5-го пальцевъ утолщена и выдается на ладонныхъ концахъ въ видѣ бугровъ; контрактуры какъ уцѣлѣвшихъ пальцевъ, такъ и потерявшихъ по одной фалангѣ Полная анестезія.

Нижнія конечности. Паховыя и бедренныя желѣзы увеличены. На голеняхъ большіе, бѣлые рубцы. Въ пальцахъ мутиляціи: отсутствіе въ большинствѣ по одной, двѣ фаланги; на лѣвой сторонѣ вмѣстѣ съ тѣмъ смѣщеніе пальцевъ (рубцами), а именно: 1, 2, 3 и 5 пальцы находятся на одной линіи, 4-й же палецъ помѣщается совершенно подъ 2-мъ и 3-мъ. На лѣвой же подошвѣ прободающая язва. Отсутствіе сухожильныхъ рефлексовъ. Полная анестезія.

277. Кулдашь-Юлдашевъ.

6) Кулдашъ-Юлдашевъ, 66 лѣтъ. Родомъ изъ Ходжентскаго уѣзда. Родные не болѣли (?). Жена умерла 7 лѣтъ тому назадъ, проказою не болѣла; отъ нея у Юлдашева было 2 дѣтей: сынъ, больной проказою (раньше отца—см. ниже) и дочь, 25 лѣтъ, замужняя и имѣющая двухъ здоровыхъ дѣтей.

Anamnesis. Болѣзнь обнаружилась въ 1878 году, весною, въ формѣ пузырей на правой ляжкѣ, а къ осени распространилась на ноги; въ слѣдующемъ году пузыри явились уже на лѣвой ногѣ.

St. praesens. Равномѣрный, не объемистый инфильтратъ кожи лба, щекъ, носа и губъ; отсутствіе рѣсницъ и бровей и рѣдкіе усы въ серединѣ; борода густая. Слизистая оболочка нёба очень суха; въ носу насыхаютъ корки, но форма его не измѣнена.

Туловище. Пятенъ ни на груди, ни на спинѣ нѣтъ, но кожа морщиновата, атрофична. Правый придатокъ утолщенъ и слегка узловатъ.

Верхнія конечности. Кромѣ рубцовъ на локтяхъ и морщиноватой, атрофической кожи (бывшіе инфильтраты) никакихъ измѣненій.

Нижнія конечности. Въ кожѣ голеней узловатый инфильтратъ; пальцы ногъ утолщены на столько, что 2-й палецъ не помѣщается въ ряду съ другими, а лежитъ подъ 1-мъ и 3-мъ.

Анестезія общая.

278. Саибъ-Назаръ-Кулдашбаевъ

7) Саибъ- Назаръ-Кулдашбаевъ, 30 лѣтъ (?). Уроженецъ Ходжентскаго уѣзда. Болѣнъ отецъ (277). Женился въ махау-ханѣ, гдѣ находится 6 лѣтъ, на прокаженной же, но она умерла; женился на другой—Биби-Курмаджанъ (№ 294).

Anamnesis. Болѣзнь обнаружилась лѣтъ 10 или болѣе пузырями, въ видѣ ожоговъ, на локтевомъ краѣ праваго предплечія, а черезъ мѣсяцъ пузыри явились и на голени той же стороны.

St. praesens. Видъ ребяческій. Лице опухшее, красное, инфильтрованное, но гладкое; инфильтратъ съ неясной узловатостью.

TAFEL XXVIII.

Saib Nasar (№ 278). 30 a. n. Sohn des Kuldasch (Taf. XXVI. 2).

Anamnesis. Ueber 10 Jahre krank, in der Ansiedelung 6 Jahre. Beginn: Pemphigus auf dem rechten Oberarm; einen Monat später auf dem Unterschenkel.

Stat. praes. Leicht knotiges Infiltrat des Gesichts (Narben nach sartischen Geschwüren auf den Wangen); knabenähnlicher Habitus; von Bart oder Schnurrbart keine Spur (frühe Erkrankung). Pemphigusgeschwüre auf den Ellbogen; Muskelatrophie und Fingercontracturen der Hände. Zahlreiche Narben an den unteren Extremitäten. Allgemeine, complete Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

Глаза почти закрыты нависшими, опухшими и лишенными волосъ бровями; верхняя губа очень толста. Усовъ и бороды ни слѣда. На обѣихъ щекахъ углубленные бѣлые рубцы (не папахурда ли?). Мягкое нёбо инфильтровано; цвѣтъ его блѣдный; uvula уничтожена.

Туловище. На спинѣ и груди пятенъ нѣтъ. Penis малъ, но головка его велика и инфильтрована твердыми узлами; отверстіе urethrae сужено; придатки узловато—утолщены. Паховыя железы увеличены.

Верхнія конечности. Инфильтрата нѣтъ. На локтяхъ язвы, окруженныя бѣлой, шелушащейся кожицей и рубцы. Таковыя же въ различныхъ мѣстахъ на предплечіяхъ. Thenar et antithenar сильно атрофированы, въ особенности на лѣвой сторонѣ. Контрактура пальцевъ, на правой сторонѣ слабая,на лѣвой—наоборотъ—очень рѣзкая. У основанія лѣваго мизинца язва въ формѣ омозолѣлой трещины.

Нижнія конечности. Инфильтрата также нѣтъ, кромѣ кожи стопъ, гдѣ находятся и обильные рубцы. Пальцы значительно утолщены. Пателлярный рефлексъ отсутствуетъ.

Анестезія общая, полная.

279. Ай-Мухамедъ-Шамуратовъ.

8) Ай-Мухамедъ-Шамуратовъ, 47 лѣтъ. Киргизъ Ходженскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣлъ проказою только братъ матери, но онъ умеръ, когда Ай-Мухамедъ былъ еще здоровъ. Шамуратовъ женатъ 2 года (жена его Биби-Зухра № 289).

Anamnesis. Болѣнъ 7 лѣтъ (въ пріютѣ находится 2 года). Болѣзнь началась съ пузыря на правомъ колѣнѣ.

St. praesens. Кожа лица опухшая, красная, инфильтрованная; инфильтратъ плотный, узловатый; мѣстами—правая щека, лобъ—поверхностные узлы; кой-гдѣ покрытыя струпьями поверхностныя язвы. Носъ нѣсколько приплюснутъ. Въ лѣвомъ углу рта язва, по краямъ рубцующаяся. Бровей, рѣсницъ, усовъ и бороды ни слѣда.

Туловище. На животѣ, въ правомъ подреберьѣ, обширный рубецъ (бывшій pemphigus). Около отверстія urethrae съ лѣвой стороны выдается твердый узелъ; придатки утолщены и узловаты; опухоль паховыхъ железъ.

TAFEL XXX.

Tursun-Mahomet (№ 280). 26 a. n.

Anamnesis. Ein Onkel und Vetter sind krank gewesen. Beginn: Blasen auf dem Handrücken.

Stat. praes. Primäre nervöse Form. Fibrilläre Zuckungen der Gesichtsmuskeln. Die Buchstaben b und p spricht er undeutlich aus. Mutilationen und Contracturen der Finger. Mutilationen der Zehen am linken Fuss. Geschwüre ebendaselbst. Complete Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

TAFEL XXXI.

Nasar-Mahomet (№ 281). 34 a. n.

Anamnesis. Vater, Mutter, Onkel und Tante sind leprös gewesen. Seit 23 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 20 Jahren.

Stat. praes. Secundäre nervöse Form: keinerlei Infiltrate; eingefallene Nase; weder Augenbrauen, noch Wimpern, noch Schnurr—und Backenbart; Narben am weichen Gaumen. Mutilationen an den Fingern und Zehen (cf. die Abbilt 24 im Text). Atrophie der Muskeln an den Händen, Ober—und Unterschenkeln. Complete, allgemeine Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

зою и умерли въ пріютѣ прокаженныхъ, не помнитъ когда; два брата и одна сестра живы и здоровы; вообще между родными было много больныхъ проказою. Назаръ женатъ въ пріютѣ; дѣтей нѣтъ (импотентъ); жена Раджанъ № 295.

Anamnesis. Болѣнъ 23 года; въ пріютѣ 20 лѣтъ.

St. praesens. Сильно истощенный субъектъ. Лице старческое, худое; кожа бѣлая, стянута обильными рубцами. Ectropion обѣихъ нижнихъ вѣкъ, на правой сторонѣ полный; бровей и рѣсницъ нѣтъ, также какъ и усовъ и бороды. Носъ—конецъ и крылья—приплюснуты; губы толсты, но мягки. На мягкомъ нёбѣ рубцы; uvula цѣла.

Туловище. Пятенъ нѣтъ. Penis и яички атрофичны.

Верхнія конечности. Обильные рубцы. Атрофія мышцъ предплечій и кистей, мутиляціи и контрактуры пальцевъ. На правой рукѣ: дефектъ 1-й и 2-й фаланги указательнаго и 3-й 2-й и частью 1-й фалангъ 3-го и 4-го пальцевъ; контрактура большого пальца и мизинца (1-я фаланга послѣдняго оттянута, кромѣ того, къ наружи и вверхъ). На лѣвой рукѣ: дефектъ 3-й фаланги указательнаго пальца; контрактура остальныхъ пальцевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ смѣщеніе 1-хъ фалангъ: основаніе ихъ помѣщается на ладонной поверхности головокъ пястныхъ костей, а эти послѣднія на тылѣ кисти выдаются въ видѣ рѣзкаго валика.



Рис. 24. Правая и лѣвая стопа Шакирова: *я* язва; *н*—уродливые остатки ногтя.

Нижнія конечности. Повсемѣстные рубцы. Атофія мышцъ бедеръ и голеней. Мутиляціи на рисункѣ. Сухожильные рефлексы отсутствуютъ. Полная, общая анестезія.

282. Мухамедъ-Шарифъ-Раджанъ-Мухамедовъ.

11) Мухамедъ-Шарифъ-Раджанъ-Мухамедовъ, 25 л. Уроженецъ Пенджкентскаго района (заравшанской области). Родители умерли, проказою не болѣли (?); изъ родныхъ больна сестра, находящаяся вмѣстѣ съ нимъ въ пріютѣ (№ 293).

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ (въ махау-ханѣ 6 лѣтъ). Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на правой голени, около колѣна; черезъ годъ пузырь явился на правомъ локтѣ.

St. praesens. Лице пухлое, красноватое. Равномѣрный, слегка узловатый инфильтратъ кожи лба, щекъ, губъ; носъ утолщенъ, но форма его не измѣнена. На лбу 2 рубца (пашахурда въ дѣтствѣ). Волосъ на бровяхъ и рѣсницахъ нѣтъ; усовъ и бороды ни слѣда.

Туловище. На груди и спинѣ пятенъ нѣтъ. Penis и testes не развиты, правое яичко помѣщается въ паховомъ каналѣ.

Верхнія конечности. Мышцы дѣтски развиты. На локтяхъ рубцы. Другихъ измѣненій нѣтъ.

Нижнія конечности. Кромѣ обильныхъ рубцовъ измѣненій нѣтъ. Мышцы очень слабо развиты. Пателлярный рефлексъ отсутствуетъ.

Общая полная анестезія.

283. Турсунъ-Курбановъ.

12) Турсунъ-Курбановъ, 24 лѣтъ. Уроженецъ Ура-Тюбе. У дяди его было 6 человѣкъ дѣтей и всѣ прокаженные; пять старшихъ умерло, самый младшій Джурабай (284) еще живъ, живетъ у отца дома. Турсунъ Холостъ.

Anamnesis. Болѣнъ 11 лѣтъ, а въ махау-ханѣ 10 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на тылѣ праваго предплечія, а черезъ $1^1/_2$ года—на лѣвомъ.

St. praesens. Лице не очень опухшее, морщиноватое (лобъ); инфильтратъ довольно твердый, узловатый. Ни бровей и ресницъ, ни усовъ и бороды нѣтъ. Носъ ввалился и приплюснутъ. На мягкомъ нёбѣ глубокій узелъ; инфильтратъ дужекъ и uvulae.

Туловище. Кое-гдѣ рубцы. Узловатый инфильтратъ придатковъ.

Верхнія конечности. Обильныя язвы и рубцы; одна язва въ пятакъ—на передней поверхности лѣваго плеча въ серединѣ Слабый инфильтратъ (узловатый) тыла плечъ, еще слабѣй—предплечій и кистей.

Нижнія конечности. На передней поверхности бедеръ обильныя язвы (на правомъ 7, на лѣвомъ—3); большая часть язвъ по-

TAFEL XXXII. Fig. 1 und 2.

Fig. № 1. Mahomet Schafir (№ 282). 25 a. n.

Anamnesis. Seine Mutter ist leprös gewesen und gestorben; eine Schwester, ist noch zur Zeit leprös und befindet sich gleichfalls in der Ansiedelung (№ 293); er selbst ist seit 9 Jahren krank (in der Ansiedelung seit 6 Jahren, die Schwester seit 1 Jahre). Beginn: Blasen am rechten Knie.

Stat. praes. Stadium florescentiae. Röthliche Gesichtsfarbe, gleichmässige Infiltration (auf der Stirn Spuren des sartischen Geschwürs); keine Spur von Bart und Schnurrbart. An den Extremitäten, abgesehen von Pemphigusnarben, keine Veränderungen vorhanden. Complete, allgemeine Anaesthesie.

Fig. 2. Turssun Kurbanoff (№ 283). 24 a. n.

Anamnesis. Sein Onkel hat 6 Kinder gehabt, die sämmtlich leprös gewesen sind, 5 sind gestorben, der letzte (cf. Taf. XXXIII, 1) lebt beim Vater. Tursun selbst ist seit 11 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 10 Jahren. Beginn: Blasen auf dem Vorderarm.

Stat. praes. Recht derbe, knotige Infiltration des Gesichts, unbedeutende Infiltration der Extremitäten, aber zahlreiche Pemphigusgeschwüre und Narben auf den letzteren. Allgemeine, complete Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

TAFEL XXXIII. Fig. 1 und 2.

Fig. 1. Dshurabey (№ 284). 14 a. n.

Anamnesis. 5 von seinen Brüdern sind leprös gewesen und gestorben. Er selbst ist seit 7 Jahren krank; des Beginnes erinnert er sich nicht.

Stat. praes. Gleichmässiges Infiltrat im Gesicht; dasselbe röthlich verfärbt (stadium florescentiae), auf der Oberfläche zahlreiche Erosionen mit dunkeln Borken bedeckt (Eczem?); eine ähnliche (gleichmässige) Infiltration befindet sich auf dem Dorsum der Ober und Vorderarme. Auf der Palmarfläche des rechten Zeigefingers, an der Articulation der 2 und 3 Phalanx, eine rhagadenförmige Ulceration. Pemphiginöse Narben auf den Ellbogen. Sensibilität erhalten.

Fig. 2. Baba-Mullah (№ 285). 20 a. n. Stammt aus Karategin.

Anamnesis. 2 Schwestern von ihm sind krank gewesen und gestorben. Er selbst ist seit 8 Jahren krank und seit 5 Jahren im Asyl. Beginn: eine Blase auf dem linken Ellbogen.

Stat. praes. Geringe, leicht knotige Infiltration des Gesichts; auf dem Dorsum der Vorderarme atrophirende Knoten. Muskelatrophie an den Händen und Contracturen der Finger. Infiltration, Sclerose und Desquamation der Unterschenkel und Füsse. Complete, allgemeine Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

крыта струпьями; тамъ, гдѣ струпья отдѣлились, дно язвы возвышается надъ поверхностью кожи; оно гладкое, красное, сухое; края язвы слабо инфильтрованы, пигментированы; форма ихъ неправильная; мѣстами фіолетовые рубцы. На правомъ колѣнѣ, снаружи, 3 язвы такого же качества, какъ и на бедрахъ. На правой голени, на наружной и частью передней поверхности, большая язва (величиною въ ладонь), углубленная, съ рѣзкими, неправильными, инфильтрованными краями и изрытымъ, сильно кровоточащимъ дномъ. Всѣ язвы развились послѣ пузырей, похожихъ на ожоги. Кожа стопъ утолщена, склерозирована.

Анестезія общая, полная.

284. Джурабай-Джатгабаевъ.

13) Джурабій-Джатгабаевъ, 14 лѣтъ. Уроженецъ Ура-Тюбе. Живетъ у отца. Болѣли и умерли 5 братьевъ. Холостъ.

Anamnesis. Болѣнъ болѣе 7-ми лѣтъ. Какъ началась болѣзнь—не знаетъ.

St. praesens. Лице полное, красное, гладкое, безъ морщинъ. Инфильтратъ равномѣрный, слегка узловатый; на поверхности обильныя ссадины (eczaema), покрытыя струпьями. Волосъ ни слѣда. Носъ ввалился. На нёбѣ узловатая полоса, идущая отъ рѣзцовъ къ uvula.

Туловище. Ничего особеннаго. Въ головкѣ ощущаются узлы. Testes не развиты и величиною въ горошину.

Верхнія конечности. Довольно рѣзко выраженный узловатый инфильтратъ тыла, плечъ и предплечій. Рубцы на локтяхъ. На правомъ указательномъ пальцѣ, между 2-ю и 3-й фалангой, на ладонной поверхности, язва въ видѣ трещины.

Нижнія конечности. Измѣненій нѣтъ. Сухожильные рефлексы сохранены.

Чувствительность сохранена.

285. Баба-Мулла-Сафаръ-Бековъ.

14) Баба-Мулла-Сафаръ-Бековъ, 20 лѣтъ. Уроженецъ Каратегина. Родители были здоровы; мать еще жива; проказою болѣли 2 сестры и уже умерли. Холостъ.

Anamnesiss. Болѣнъ 8 лѣтъ, а въ махау-ханѣ 5 лѣтъ (5 л. прибылъ изъ Каратегина). Болѣзнь началась съ пузыря на лѣвомъ локтѣ.

St. praesens. Лице не очень опухшее, но инфильтратъ есть: въ кожѣ лба слегка узловатый, въ остальныхъ мѣстахъ равномѣрный. Рѣсницы есть, но бровей, усовъ и бороды совершенно нѣтъ. Форма носа не измѣнена. На нёбѣ и языкѣ обильные узлы; слизистая оболочка суха.

Туловище. На спинѣ буроватыя, небольшія пятна, на груди нѣтъ. Penis и яички не развиты.

Верхнія конечности. На плечахъ сзади мелкія буроватыя пятна и поверхностные, атрофирующіеся узлы. На локтяхъ рубцы. На правомъ предплечіи—болѣе на локтевой сторонѣ—поверхностные узлы; одинъ изъ нихъ, изъязвившійся, покрытъ струпомъ. Атрофія мышцъ кистей и контрактура—умѣренная—пальцевъ.

Нижнія конечности. На бедрахъ спереди и снаружи такія же пятна, какъ и на спинѣ и плечахъ, только на ощупь тверже. На лѣвомъ колѣнѣ и обѣихъ голеняхъ рубцы. Кожа голеней и стопъ слегка инфильтрована и склерозирована, epidermis шелушится. Сухожильные рефлексы отсутствуютъ.

Общая, полная анестезія.

286. Иръ-Магомедъ-Бабаяровъ.

15) Иръ-Магомедъ Бабаяровъ, 31 года. Родина около Ташкента. Изъ родныхъ болѣла мать; умерла 10 лѣтъ тому назадъ. Иръ женатъ въ махау-ханѣ, гдѣ онъ находится 3 года, на прокаженной.

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ. Болѣзнь началась пузыремъ на наружной поверхности праваго бедра.

St. praesens. Кожа лба не измѣнена. Въ сторонѣ бровей, лишенныхъ волосъ, мелкіе, поверхностные узлы. Кожа щекъ красная, слегка инфильтрованная; кой-гдѣ aene. Рѣсницъ нѣтъ. Въ толщѣ верхнихъ вѣкъ на той и другой сторонѣ крупные узлы. Носъ въ серединѣ ввалился. Губы утолщены; на краяхъ верхней губы поверхностные, плоскіе (всасывающіеся) узлы. Борода и усы рѣдкіе. Все

TAFEL XXXIV.

Ir-Mahomet (№ 286). 31 a. n.

Anamnesis. Die Mutter ist leprös gewesen und vor 10 Jahren gestorben. Er selbst seit 9 Jahren krank. Beginn: Eine Blase auf dem rechten Oberschenkel.

Stat. praes. Knotiges Infiltrat, stellenweise oberflächliche, atrophirende Knoten. Ebensolche oberflächliche atrophirende Knoten auf den Oberarmen. Zahlreiche Narben auf den Extremitäten. Die Haut der Füsse und Zehen gleichmässig in nicht sehr hohem Grade infiltrirt. Allgemeine, complete Anaesthesie.

Ura Tjube. 1885.

мягкое и твердое нёбо покрыто узлами; на серединѣ языка довольно большіе узлы, отдѣленные другъ отъ друга глубокими бороздками; на краяхъ языка отдѣльныя бѣлыя папулы, а подъ ними твердые узелки.

Туловище. Измѣненій нѣтъ. Въ головкѣ ствола узлы и рубецъ (изъязвившійся узелъ); въ нижней половинѣ мошонки папулы; паховыя желѣзы увеличены.

Верхнія конечности. На правомъ плечѣ, сзади, узлы—поверхностные, мягкіе, сморщенные (атрофирующіеся); на лѣвой сторонѣ ихъ мало. На локтяхъ и предплечіяхъ рубцы. Кисти не измѣнены.

Нижнія конечности. На колѣнахъ, бедрахъ и голеняхъ рубцы. Кожа стопъ слегка инфильтрована, синеватаго цвѣта; Концы пальцевъ утолщены.

Анестезія общая и полная.

287. Мулла-Турсунъ-Махомедъ.

16) Мула-Турсунъ-Махомедъ, 55 лѣтъ. Уроженецъ Ура-Тюбе. Богатый купецъ. Живетъ дома. Родные не болѣли (?). Женатъ; имѣетъ 2-хъ сыновей—27 и 20 лѣтъ—они здоровы.

Anamnesis. Болѣнъ 5 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на тылѣ ручной кисти, между 2-мъ и 3-мъ пальцемъ.

St. praesens. Лице нѣсколько опухшее. Въ бровяхъ мягкій, слегка узловатый инфильтратъ; волосковъ на той и другой сторонѣ около десятка; въ верхнихъ вѣкахъ по бляшкѣ—правая плотнѣй и больше лѣвой; рѣсницъ нѣтъ. Кожа щекъ вялая, обвислая; въ отдѣльныхъ мѣстахъ глубокіе узлы. Носъ съ сѣдловиной. Губы толсты.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. Кожа вялая, шелушится (всосавшійся инфильтратъ); кой гдѣ остатки узловатаго инфильтрата—на правомъ плечѣ рѣзче. Рубцовъ нѣтъ.

Нижнія конечности. На бедрахъ пятна. Вдоль ахиллова сухожилья глубокіе кожные узлы; спереди ихъ мало. Кожа стопъ атрофична (всосавшійся инфильтратъ), шелушится.

Чувствительность слегка ослаблена.

288. Норъ-Биби-Рахманъ-Бердіева

17) Норъ-Биби-Рахманъ-Бердіева, 58 лѣтъ. Уроженка Ура-Тюбе. Изъ родныхъ болѣла мать и умерла въ пріютѣ. Вдова; дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 46 лѣтъ; въ пріютѣ 33 года. Болѣзнь началась пузырями на рукахъ.

St. praesens. Крайне истощена. Лицо блѣдное, скошено въ лѣво. Кожа вялая, обвислая. Брови рѣдки, рѣсницы есть. Роговыя оболочки мутны; ectropion обѣихъ вѣкъ.



Рис. 25. Правая и лѣвая кисть Бердіевой. Н—ноготь.

Верхнія конечности. Атрофія мышцъ. Обильные рубцы. На правой сторонѣ: полная мутиляція кисти. На наружной сторонѣ культи уродливый ноготь. На лѣвой сторонѣ—см. рисунокъ.

Нижнія конечности. Обильные рубцы. На правой стопѣ плюсневыя кости и фаланги отсутствуютъ. На лѣвой дефектъ мизинца; на мѣстѣ дефекта уродливвый ноготь.

18 $^{27}/_{VI}$ 85

289. Биби-Зухра-Ніазъ-Бодалева.

18) Биби-Зухра-Ніазъ-Бодалева, 35 лѣтъ. Ура-Тюбинскаго уѣзда. Родители померли давно; изъ родныхъ болѣли двое (кто?) и умерли 3 года тому назадъ. Замужемъ за Ай Мухамедомъ (№ 279); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 24 года (въ махау-ханѣ 5 лѣтъ). Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на тылѣ праваго предплечія.

St. praesens. Лицо бурое. Кожа вялая, обвислая; инфильтратъ мягкій (всосавшійся). Бровей и рѣсницъ нѣтъ. Носъ ввалился. На мягкомъ нёбѣ сухая, рубцовая поверхность; около uvulae, съ правой стороны, полулунный дефектъ свободнаго края; на самой uvula небольшая язвочка; дужки утолщены.

Верхнія конечности. На локтевой сторонѣ праваго предплечія обильные рубцы. Мышечная атрофія, сильнѣй выражен-

ная на правой, чѣмъ на лѣвой сторонѣ. Контрактура пальцевъ, преимущественно 3-го, 4-го и 5-го. Трясеніе въ рукахъ.

Нижнія конечности. Рубцы. На внутренней поверхности лѣвой стопы—язва, въ видѣ трещины, съ мозолисто-утолщеннымъ и растрескавшимся epidermis.

Анестезія общая, полная.

290. Гульджа-Махомедъ-Юсупова.

19) Гульджа-Махомедъ-Юсупова, 25 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго уѣзда. Родители умерли, не знаетъ отчего; старшая сестра была больна проказою и умерла 10 лѣтъ тому назадъ въ пріютѣ. Гульджа замужемъ за Бай-Мухамедомъ (№ 276); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 12 лѣтъ. Въ пріютѣ 9 лѣтъ. Болѣзнь началась пузырями на лѣвомъ локтѣ, а черезъ 2 года такой же пузырь показался на правомъ.

St praesens. Лице блѣдное, со слѣдами натуральной оспы (бывшей въ дѣтствѣ); кожа не инфильтрована, гладка. Брови рѣдки. Фибриллярныя сокращенія мышцъ, въ особенности рѣзко замѣтныя, если больная дѣлаетъ попытку надуть губы. На мягкомъ нёбѣ большой рубецъ; uvula укорочена и притянута впередъ.

Верхнія конечности. На локтяхъ, лѣвомъ предплечіи и правомъ большомъ пальцѣ (тылѣ)—рубцы. Атрофія мышцъ и контрактура всѣхъ пальцевъ, сильнѣе выраженная на лѣвой сторонѣ. На кистяхъ же обильные пузыри свѣжаго pemphigus.

Нижнія конечности. Рубцы. Пальцы утолщены. Подъ большимъ лѣвымъ пальцемъ, на подошвѣ, поперечная трещина.
Анестезія полная и общая.

291. Рака-Бакальянова.

20) Рака-Бакальянова, 20 лѣтъ. Уроженка Ура-Тюбинскаго уѣзда. Отецъ былъ болѣнъ проказою; мать—нѣтъ. Замужемъ за Махмедъ-Юсуфомъ (№ 274); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 9 лѣтъ; въ Кишлакѣ-махау 4 года. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на правомъ локтѣ, а черезъ годъ на лѣвомъ. Регулъ не было.

St. praesens. Лице какъ будто нормальное, но бровей и рѣсницъ нѣтъ и носъ нѣсколько ввалился. Правый глазъ не совсѣмъ закрывается (нижнее вѣко); надувается только лѣвая щека.

Верхнія конечности. Рубцы. На правомъ предплечіи, на ульнарной сторонѣ, свѣжій pemphigus, занимающій всю длину предплечія и 3-го пальца въ поперечникѣ. На лѣвой рукѣ замѣтная атрофія мышцъ и контрактура 3-го и 4-го и главнымъ образомъ 5-го пальца.

Нижнія конечности. Рубцы. Слабая атрофія мышцъ голени. Пальцы немного утолщены.

Анестезія и аналгезія общая. Потеря вкуса и обонянія.

292. Хамра-Мухамедъ-Юсупова.

21) Хамра-Мухамедъ-Юсупова, 23 лѣтъ. Уроженка Ходжентскаго уѣзда. Родители были здоровы; проказою болѣлъ изъ родныхъ дядя (по матери) умеръ давно (когда?). Замужемъ въ пріютѣ за Шатансуровымъ (№ 275); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 9 лѣтъ; въ пріютѣ 4 года. Болѣзнь обнаружилась на лѣвомъ наружномъ мыщелкѣ, а черезъ 5 лѣтъ—на лѣвой ногѣ. Лице стало пухнуть послѣ пузырей. Регулъ нѣтъ и не было.

St. praesens. Лице не очень полное, красноватое. Инфильтрата нѣтъ. Мѣстами васкуляризаціи. Брови и рѣсницы рѣдки. Верхняя губа толста. Щеки надуваетъ слабо. Въ полости рта ничего особеннаго.

Верхнія конечности. Узловатый инфильтратъ тыла плечъ и предплечій; на послѣднихъ отдѣльные поверхностные узлы.

Нижнія конечности. На лѣвомъ наружномъ мыщелкѣ бѣлый рубецъ.

Полная, общая анестезія.

293. Одыля-Джанъ-Раджанъ-Мухамедова.

22) Одыля-Джанъ-Раджанъ-Мухамедова, 25 лѣтъ. Уроженка Пенджкентскаго уѣзда. Мать страдала проказою и умерла;

отецъ былъ здоровъ; болѣнъ въ настоящее время братъ ея, Мухамедъ-Шарифъ (№ 282). Дѣвушка.

Anamnesis. Больна 10 лѣтъ; въ пріютѣ 1 годъ. Болѣзнь началась пузыремъ на лѣвой ulna, около локтя. Рѣсницъ нѣтъ и не было.

St. praesens. Лице одутловатое, красное; инфильтратъ равномѣрный, довольно плотный. Въ правой брови бляшка; края вѣкъ утолщены; бровей и рѣсницъ нѣтъ. Носъ утолщенъ, но форма его не измѣнена. На твердомъ нёбѣ въ срединѣ бляшка, величиною въ гривенникъ; въ центрѣ бляшки язвочка, рѣзко ограниченная.

Верхнія конечности. Инфильтратъ мелко узловатый тыла плечъ и предплечій. Рубцы на локтяхъ. Атрофія мышцъ кистей, болѣе выраженная на лѣвой сторонѣ. Контрактура обоихъ мизинцевъ.

Нижнія конечности. Рубцы на колѣнкахъ. Кожа голеней утолщена, склерозирована, напряжена—лоснится и шелушится. На тылѣ спины рожистая краснота и неясный, узловатый инфильтратъ.

Полная анестезія и потеря вкуса и обонянія.

294. Биби-Курмаджанъ-Мулла-Надырева.

13) Биби-Курмаджанъ-Мулла-Надырева, 20 лѣтъ. Уроженка Ходжентскаго уѣзда. Отецъ и братъ болѣли проказою и умерли; отецъ недавно, братъ 6 лѣтъ тому назадъ (болѣли 9 лѣтъ) есть еще два брата, но тѣ здоровы, также, какъ и мать. Замужемъ за Саибъ-Назаромъ (№ 278); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 14 лѣтъ; въ махау-ханѣ 5 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на лѣвой голени сзади, около ахиллова сухожилья; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ стало пухнуть лице. Регулъ нѣтъ и не было.

St. praesens. На лицѣ eczema. Кожа утолщена, красновато-бураго цвѣта; инфильтратъ разлитой; бровей нѣтъ; рѣсницы цѣлы. Форма носа не измѣнена, онъ утолщенъ. На краяхъ ноздрей и губъ нѣсколько поверхностныхъ узловъ. На мягкомъ нёбѣ отдѣльные узелки; uvula васкуляризована.

Верхнія конечности. Инфильтратъ равномѣрный тыла плечъ и предплечій. Eczema.

Нижнія конечности. Инфильтратъ голеней незначительный; шелушеніе. Свѣжій pemphigus на лѣвой голени, около стопы, спереди (величиною въ бобъ); на правой—около наружнаго мыщелка и на тыльной поверхности стопъ. Анестезія.

295. Раджанъ-Джанъ-Хасанбаева.

24) Раджанъ-Джанъ-Хасанбаева, 15 лѣтъ. Уроженка Пенджкентскаго уѣзда. Изъ родныхъ болѣла проказою мать, умерла 6 лѣтъ тому назадъ; также болѣлъ проказою дядя по матери, умеръ тоже около 6 лѣтъ. Замужемъ въ пріютѣ за Назаръ-Мухамедомъ (№ 281); дѣтей нѣтъ.

Anamnesis. Больна 5 лѣтъ. Болѣзнь началась пузыремъ на ульнарной сторонѣ лѣваго предплечія. Регулъ нѣтъ и не было.

St. praesens. Лице нормально; инфильтрата нѣтъ. Брови и рѣсницы рѣдки. Въ полости рта никакихъ измѣненій.

Верхнія конечности. На локтяхъ и предплечіяхъ рубцы; большой рубецъ на тылѣ праваго предплечія.

Нижнія конечности. Кромѣ рубцевъ на колѣнахъ никакихъ измѣненій.

Анестезія общая.

296. Портавъ-Джанъ-Зуйлуева.

25) Портавъ-Джанъ-Зуйлуева, 22 лѣтъ. Изъ Пенджкентскаго уѣзда. Родители болѣли песью и умерли; въ сосѣдствѣ въ кишлакѣ былъ больной проказою. Мужъ, больной проказою, умеръ 4 года тому назадъ; дѣтей не было.

Anamnesis. Больна 8 лѣтъ; въ пріютѣ 2 года. Болѣзнь обнаружилась небольшимъ бѣлымъ пятномъ на внутренней поверхности лѣваго плеча.

St. praesens Лице скошено на лѣво и глаза не вполнѣ закрываются. Въ остальномъ измѣненій нѣтъ. Бѣлое пятно на шеѣ спереди.

Верхнія конечности. Бѣлыя пятна на передней поверхности лечъ, на лѣвомъ большей величины, чѣмъ на правой. Концы пальцевъ бѣлаго цвѣта.

Нижнія конечности. Бѣлыя пятна на наружной поверхности лѣвой голени, около колѣна; на правой—нѣтъ. Пятна представляютъ характеръ пессевыхъ.

Анестезія.

Грудь, спина, животъ и бедра не осмотрѣны.

297. Рукія-Мухамедъ-Юсупова.

26) Рукія-Мухамедъ-Юсупова, 13 лѣтъ. Уроженка Ура-Тюбе. Отецъ ея умеръ, не знаетъ когда; мать вышла замужъ, а отчимъ отправилъ ее въ пріютъ. Болѣлъ ли кто изъ родныхъ проказою—не знаетъ.

Anamnesis. Больна, говорятъ, 5 лѣтъ; въ пріютѣ 4 года.

St. praesens. По развитію похожа на 6-ти лѣтняго ребенка, но представляетъ видъ 50-ти лѣтней старухи: лицо темнаго цвѣта, опухшее, морщиноватое. Въ кожѣ лица узловатый, бляшковый инфильтратъ; носъ широкъ, приплюснутъ; губы утолщены; бровей и рѣсницъ нѣтъ. На щекахъ и губахъ поверхностныя язвы. Мягкое нёбо инфильтровано, блѣдно. Uvula уничтожена.

Верхнія конечности. На тылѣ плечъ и предплечій узловатый инфильтратъ. На тылѣ правой кисти бляшка, величиной въ мѣдный пятакъ. На тылѣ первыхъ фалангъ 4-го и 5-го пальцевъ правой руки—узлы. На лѣвой сторонѣ – узловъ въ кистяхъ нѣтъ. Рубцовъ нигдѣ не видно.

Нижнія конечности. На наружной поверхности голени (обѣихъ сторонъ) плотный, узловатый инфильтратъ; въ стопахъ инфильтратъ равномѣрный. На колѣняхъ рубцы.

Анестезія.

КАТТЫ-КУРГАНЪ.

Катты-Курганъ въ заравшанскомъ отдѣлѣ, на границѣ бухарскихъ владѣній. Кишлакъ-махау по преимуществу населенъ пессевыми, которыхъ явилось къ осмотру (производившемуся частью мною,

частью почтеннымъ товарищемъ, К. Л. Бентковскимъ, въ саду уѣзднаго начальника) 52 человѣка (28 мужчинъ и 24 женщины).

ПРОКАЖЕННЫЕ.

298. Мулла-Насретдинъ.

Мулла-Насретдинъ, 35 лѣтъ. Изъ бухарскихъ владѣній. Въ пріютѣ служитъ имамомъ (священникомъ). Родители не болѣли (?). Женатъ въ пріютѣ 3 мѣсяцѣ на песевой (импотентъ).

Anamnesis. Болѣзнь обнаружилась 5 лѣтъ тому назадъ пузыремъ на лѣвомъ локтѣ.

St. praesens. Узловатый, довольно поверхностный инфильтратъ и поверхностные узлы на бровяхъ, щекахъ и губахъ. Форма носа не измѣнена.

На туловищѣ и конечностяхъ темныя пятна, а на послѣднихъ—поверхностные узлы въ отдѣльныхъ мѣстахъ, а также рубцы и язвы.

18 1/VII 85

ПЕСЕВЫЕ.

77. Мидлянъ-Рахматкуловъ.

1) Мидлянъ-Рахматкуловъ, 60 лѣтъ. Родился въ бухарскихъ владѣніяхъ. Аксакалъ Катты-Курганскаго пріюта. Вдовецъ. Болѣнъ 51 годъ, въ пріютѣ 37 лѣтъ. Первое пятно появилось на поясницѣ, въ серединѣ.

St. praesens. Весь бѣлый. Темная окраска осталась только на лицѣ, начиная съ нижней половины лба, и нѣсколько темныхъ пятнышекъ на тылѣ предплечій, около ручныхъ кистей.

У Мидляна сынъ, Сабыръ-Бай, 32-хъ лѣтъ, здоровъ. Жена, песевая, умерла.

78. Абдусатаръ-Ашимъ-Хаджа.

2) Абдусатаръ-Ашимъ-Ходжа, 58 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскій. Болѣнъ 25 лѣтъ (въ пріютѣ 12 лѣтъ); первое пятно появилось на складкѣ между большимъ и указательнымъ пальцами лѣвой руки.

St. praesens. Весь бѣлый. Темная окраска осталась на лицѣ, шеѣ, тылѣ кистей и плечъ.

Жена его:

79 (3) Халь-Биби-Рахманкулова, 28 лѣтъ. Первое пятно появилось на 3-мъ пальцѣ лѣвой руки.

St. praesens. Вся бѣлая. Темныя симметрическія пятна на лицѣ.

У нихъ 3 дѣтей (№ 27); всѣ здоровы.

80. Клычъ-Бай-Мухамедъ-Али.

4) Клычъ-Бай-Мухамедъ-Али, 37 лѣтъ. Родился въ Катты-Курганскомъ отдѣлѣ. Болѣнъ 27 лѣтъ. Первое пятно появилось на серединѣ поясницы.

St. praesens. Почти весь бѣлый. Темная окраска лица и шеи; темныя пятна на груди и симметрическія на предплечіяхъ.

Жена Ашуръ-Биби, 38 лѣтъ, тоже несевая и сынъ 8 лѣтъ, здоровый, на осмотръ не явились.

91. Тахтамышъ-Абдрасулевъ.

5) Тахтамышъ-Абдрасулевъ, 48 лѣтъ. Болѣнъ 34 года и столько же лѣтъ въ пріютѣ. Первое пятно обнаружилось въ серединѣ грудины.

St. praesens. Лице и шея темныя. На туловищѣ, на груди и поясницѣ небольшое количество бѣлыхъ пятенъ (1-е пятно—небольшое). На конечностяхъ симметрическія пятна на ульнарной сторонѣ предплечій.

У Тахтамыша 2 жены:

82 (6) Ихмамъ-Ай-Мирбабаева, 38 лѣтъ. Больна 23 года. Первое пятно явилось на поясницѣ и черезъ годъ она вся сдѣлалась бѣлая.

St. praesens. Темныя пятна на лицѣ и на радіальной сторонѣ предплечій.

У Ихмамъ двое дѣтей—сынъ Нарзулла, 11 лѣтъ, и дочь Маминъ, 3-хъ лѣтъ; здоровы

2-я жена Новатъ-Ай, не прибыла къ осмотру. По словамъ мужа, она вся бѣлая.

У Наватъ 1 ребенокъ.

83. Бурибай-Худай-Бурибаевъ.

7) Бурибай-Худай-Бурибаевъ, 25 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣл. Прадѣдъ, дяди и родители здоровы. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ пріютѣ 7 лѣтъ. Первое пятно появилось на лѣвомъ соскѣ.

St. praesens. Темное лице и шея. Бѣлое пятно въ сторонѣ лѣваго соска (на правой сторонѣ—нѣтъ). Нѣсколько пятенъ на спинѣ; одно большое пятно на поясницѣ; пятно внизу живота. На конечностяхъ: сѣтчатыя пятна на плечахъ; пятна на бедрахъ и на передней и задней поверхности лѣвой голени; на правой голени пятенъ нѣтъ. Волоса на пятнахъ голени сѣдые.

84 (8) Жена его Курматъ-Ай-Бикназарова, 35 лѣтъ. Уроженка К. Кур. отдѣла (за 2-мъ мужемъ; первый умеръ 9 лѣтъ тому назадъ; отъ него 2-е дѣтей—15 и 10 лѣтъ—оба здоровы). Больна 25 лѣтъ. Первое пятно явилось на правомъ плечѣ, а черезъ годъ на лѣвомъ.

St. praesens. Лице и шея темная. Вся въ пятнахъ.

Дѣти ея: Ишанъ-Куль и грудной ребенокъ здоровы.

85. Фазулъ-Барановъ.

9) Фазулъ-Барановъ, 30 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Болѣнъ 23 года, въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на передней поверхности лѣваго предплечія около кисти.

St. praesens. Бѣлыя пятна; на поясницѣ небольшія, съ обѣихъ сторонъ; на спинѣ—въ сторонѣ лѣвой лопатки; на лѣвомъ плечѣ и на лѣвомъ же предплечіи на ульнарной сторонѣ.

Жена его: Уматъ-Ай-Раджанъ-Акіева, 23 лѣтъ, и трое дѣтей всѣ здоровы; жена родилась въ пріютѣ отъ несевыхъ родителей.

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE